

(7) ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	4	141	478	715	666	206	14	2,224
陽性(+)	1	25	113	186	234	68	15	642
受診者数	5	166	591	901	900	274	29	2,866
陽性率 (%)	20.0	15.1	19.1	20.6	26.0	24.8	51.7	22.4

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	5	94	314	401	341	96	11	1,262
陽性(+)	0	23	66	142	134	51	1	417
受診者数	5	117	380	543	475	147	12	1,679
陽性率 (%)	0.0	19.7	17.4	26.2	28.2	34.7	8.3	24.8

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	6	232	613	935	769	308	55	2,918
陽性(+)	1	36	110	207	193	91	25	663
受診者数	7	268	723	1142	962	399	80	3,581
陽性率 (%)	14.3	13.4	15.2	18.1	20.1	22.8	31.3	18.5

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	1	49	144	321	348	172	17	1,052
陽性(+)	0	6	23	66	91	45	4	235
受診者数	1	55	167	387	439	217	21	1,287
陽性率 (%)	0.0	10.9	13.8	17.1	20.7	20.7	19.0	18.3