

16. 血液一般

赤血球、血色素、赤血球容積値、血清鉄は貧血の有無を知る目安になりMCV、MCH、MCHCは、貧血の場合はその種類を判断する指標になる。

有所見者はB2以上とする。

<血液一般検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 19 | 652 | 1,746 | 2,019 | 1,450 | 393 | 39 | 6,318 | 43.6 |
| B1 | 15 | 413 | 1,239 | 1,551 | 1,021 | 276 | 24 | 4,539 | 31.3 |
| B2 | 26 | 555 | 1,086 | 910 | 545 | 133 | 26 | 3,281 | 22.6 |
| C | 1 | 19 | 49 | 60 | 45 | 46 | 20 | 240 | 1.7 |
| D | 0 | 5 | 21 | 35 | 28 | 23 | 5 | 117 | 0.8 |
| 受診者数 | 61 | 1,644 | 4,142 | 4,575 | 3,089 | 871 | 114 | 14,496 | 100.0 |
| 有所見者数 | 27 | 579 | 1,156 | 1,005 | 618 | 202 | 51 | 3,638 | 25.1 |
| 有所見者率(%) | 44.3 | 35.2 | 27.9 | 22.0 | 20.0 | 23.2 | 44.7 | 25.1 | |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 26 | 521 | 1,284 | 1,632 | 1,200 | 353 | 26 | 5,042 | 43.4 |
| B1 | 7 | 231 | 616 | 791 | 430 | 137 | 14 | 2,226 | 19.1 |
| B2 | 24 | 610 | 1,248 | 1,022 | 502 | 138 | 11 | 3,555 | 30.6 |
| C | 2 | 78 | 251 | 133 | 51 | 23 | 6 | 544 | 4.7 |
| D | 0 | 37 | 140 | 60 | 16 | 3 | 2 | 258 | 2.2 |
| 受診者数 | 59 | 1,478 | 3,539 | 3,638 | 2,199 | 654 | 59 | 11,626 | 100.0 |
| 有所見者数 | 26 | 725 | 1,639 | 1,215 | 569 | 164 | 19 | 4,357 | 37.5 |
| 有所見者率(%) | 44.1 | 49.1 | 46.3 | 33.4 | 25.9 | 25.1 | 32.2 | 37.5 | |

② 2日人間ドック

<男性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 1 | 89 | 259 | 445 | 420 | 237 | 53 | 1,504 | 40.0 |
| B1 | 2 | 70 | 207 | 440 | 336 | 188 | 29 | 1,272 | 33.8 |
| B2 | 6 | 90 | 186 | 225 | 221 | 101 | 28 | 857 | 22.8 |
| C | 0 | 1 | 14 | 17 | 21 | 21 | 18 | 92 | 2.4 |
| D | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 13 | 4 | 39 | 1.0 |
| 受診者数 | 9 | 251 | 669 | 1,136 | 1,007 | 560 | 132 | 3,764 | 100.0 |
| 有所見者数 | 6 | 92 | 203 | 251 | 251 | 135 | 50 | 988 | 26.2 |
| 有所見者率(%) | 66.7 | 36.7 | 30.3 | 22.1 | 24.9 | 24.1 | 37.9 | 26.2 | |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 0 | 31 | 74 | 161 | 272 | 175 | 19 | 732 | 48.0 |
| B1 | 0 | 12 | 37 | 75 | 107 | 60 | 14 | 305 | 20.0 |
| B2 | 3 | 28 | 57 | 127 | 117 | 54 | 15 | 401 | 26.3 |
| C | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 12 | 3 | 60 | 3.9 |
| D | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1.7 |
| 受診者数 | 3 | 78 | 189 | 383 | 516 | 303 | 52 | 1,524 | 100.0 |
| 有所見者数 | 3 | 35 | 78 | 147 | 137 | 68 | 19 | 487 | 32.0 |
| 有所見者率(%) | 100.0 | 44.9 | 41.3 | 38.4 | 26.6 | 22.4 | 36.5 | 32.0 | |

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

| | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
| A | 1,745 | 2,673 | 2,205 | 1,377 | 80 | 0 | 8,080 | 77.7 |
| B1 | 252 | 467 | 487 | 332 | 30 | 0 | 1,568 | 15.1 |
| B2 | 69 | 163 | 130 | 84 | 8 | 0 | 454 | 4.4 |
| C | 24 | 73 | 59 | 59 | 4 | 0 | 219 | 2.1 |
| D | 10 | 17 | 18 | 26 | 2 | 0 | 73 | 0.7 |
| 受診者数 | 2,100 | 3,393 | 2,899 | 1,878 | 124 | 0 | 10,394 | 100.0 |
| 有所見者数 | 103 | 253 | 207 | 169 | 14 | 0 | 746 | 7.2 |
| 有所見者率(%) | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 9.0 | 11.3 | 0.0 | 7.2 | |

<女性>

| | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A | 746 | 1,330 | 1,204 | 543 | 26 | 0 | 3,849 | 59.2 |
| B1 | 240 | 443 | 427 | 192 | 11 | 0 | 1,313 | 20.2 |
| B2 | 148 | 307 | 211 | 62 | 2 | 0 | 730 | 11.2 |
| C | 88 | 193 | 86 | 15 | 1 | 0 | 383 | 5.9 |
| D | 47 | 127 | 43 | 11 | 1 | 0 | 229 | 3.5 |
| 受診者数 | 1,269 | 2,400 | 1,971 | 823 | 41 | 0 | 6,504 | 100.0 |
| 有所見者数 | 283 | 627 | 340 | 88 | 4 | 0 | 1,342 | 20.6 |
| 有所見者率(%) | 22.3 | 26.1 | 17.3 | 10.7 | 9.8 | 0.0 | 20.6 | |

④ 集団健診

<男性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 5,526 | 5,731 | 3,960 | 3,794 | 3,026 | 1,287 | 164 | 23,488 | 81.9 |
| B1 | 571 | 611 | 526 | 696 | 564 | 310 | 71 | 3,349 | 11.7 |
| B2 | 179 | 230 | 208 | 219 | 159 | 114 | 41 | 1,150 | 4.0 |
| C | 31 | 63 | 70 | 100 | 89 | 95 | 37 | 485 | 1.7 |
| D | 13 | 20 | 16 | 33 | 51 | 34 | 23 | 190 | 0.7 |
| 受診者数 | 6,320 | 6,655 | 4,780 | 4,842 | 3,889 | 1,840 | 336 | 28,662 | 100.0 |
| 有所見者数 | 223 | 313 | 294 | 352 | 299 | 243 | 101 | 1,825 | 6.4 |
| 有所見者率(%) | 3.5 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 13.2 | 30.1 | 6.4 | |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 2,363 | 2,542 | 1,968 | 2,410 | 2,726 | 1,731 | 205 | 13,945 | 68.0 |
| B1 | 551 | 610 | 501 | 591 | 424 | 239 | 33 | 2,949 | 14.4 |
| B2 | 363 | 532 | 490 | 289 | 215 | 216 | 48 | 2,153 | 10.5 |
| C | 141 | 282 | 283 | 117 | 62 | 92 | 26 | 1,003 | 4.9 |
| D | 57 | 92 | 209 | 60 | 18 | 10 | 9 | 455 | 2.2 |
| 受診者数 | 3,475 | 4,058 | 3,451 | 3,467 | 3,445 | 2,288 | 321 | 20,505 | 100.0 |
| 有所見者数 | 561 | 906 | 982 | 466 | 295 | 318 | 83 | 3,611 | 17.6 |
| 有所見者率(%) | 16.1 | 22.3 | 28.5 | 13.4 | 8.6 | 13.9 | 25.9 | 17.6 | |