

9. 泌尿器

(1) 尿検査：蛋白

尿蛋白は健常者でも出ることがあるが、腎臓に異常がある場合に陽性となる。

健常者でも蛋白質に富む食物を大量に摂取した後（食物性蛋白尿）や、発熱時（熱性蛋白尿）、

激しい運動後、入浴後などには蛋白尿が認められることもある。

有所見者はB 2以上とする。

<尿検査（蛋白）判定結果>

① 1日ドック

<男性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 27 | 1,004 | 3,138 | 3,779 | 2,809 | 841 | 113 | 11,711 | 81.0 |
| B1 | 13 | 352 | 868 | 683 | 368 | 81 | 13 | 2,378 | 16.5 |
| B2 | 2 | 29 | 79 | 87 | 63 | 20 | 9 | 289 | 2.0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 0 | 6 | 12 | 24 | 14 | 14 | 2 | 72 | 0.5 |
| 受診者数 | 42 | 1,391 | 4,097 | 4,573 | 3,254 | 956 | 137 | 14,450 | 100.0 |
| 有所見者数 | 2 | 35 | 91 | 111 | 77 | 34 | 11 | 361 | 2.5 |
| 有所見者率(%) | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 8.0 | 2.5 | |

<女性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 25 | 932 | 2,944 | 3,554 | 2,319 | 653 | 72 | 10,499 | 89.9 |
| B1 | 11 | 225 | 470 | 251 | 97 | 15 | 1 | 1,070 | 9.2 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------|
| B2 | 2 | 16 | 38 | 18 | 11 | 1 | 0 | 86 | 0.7 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.2 |
| 受診者数 | 38 | 1,176 | 3,465 | 3,826 | 2,428 | 670 | 73 | 11,676 | 100.0 |
| 有所見者数 | 2 | 19 | 51 | 21 | 12 | 2 | 0 | 107 | 0.9 |
| 有所見者率(%) | 5.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | |

②2日ドック

<男性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 9 | 148 | 539 | 774 | 886 | 488 | 116 | 2,960 | 85.3 |
| B1 | 3 | 45 | 120 | 115 | 108 | 41 | 5 | 437 | 12.6 |
| B2 | 0 | 4 | 20 | 10 | 14 | 7 | 4 | 59 | 1.7 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0.4 |
| 受診者数 | 12 | 197 | 685 | 903 | 1,012 | 537 | 125 | 3,471 | 100.0 |
| 有所見者数 | 0 | 4 | 26 | 14 | 18 | 8 | 4 | 74 | 2.1 |
| 有所見者率 (%) | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | |

<女性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 1 | 48 | 190 | 324 | 430 | 270 | 46 | 1,309 | 94.3 |
| B1 | 2 | 7 | 25 | 16 | 13 | 8 | 2 | 73 | 5.3 |
| B2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.4 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| 受診者数 | 4 | 55 | 216 | 341 | 446 | 278 | 48 | 1,388 | 100.0 |
| 有所見者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 有所見者率(%) | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

| | ～39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 1,338 | 2,636 | 2,148 | 1,676 | 136 | 0 | 7,934 | 77.0 |
| B1 | 486 | 773 | 457 | 271 | 24 | 0 | 2,011 | 19.5 |
| B2 | 56 | 85 | 79 | 59 | 8 | 0 | 287 | 2.8 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 9 | 11 | 26 | 26 | 2 | 0 | 74 | 0.7 |
| 受診者数 | 1,889 | 3,505 | 2,710 | 2,032 | 170 | 0 | 10,306 | 100.0 |
| 有所見者数 | 65 | 96 | 105 | 85 | 10 | 0 | 361 | 3.5 |
| 有所見者率(%) | 3.4 | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 5.9 | 0.0 | 3.5 | |

<女性>

| | ～39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 864 | 2,087 | 1,713 | 847 | 47 | 0 | 5,558 | 86.7 |
| B1 | 229 | 370 | 143 | 40 | 2 | 0 | 784 | 12.2 |
| B2 | 14 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0.8 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.3 |
| 受診者数 | 1,109 | 2,491 | 1,873 | 890 | 49 | 0 | 6,412 | 100.0 |
| 有所見者数 | 16 | 34 | 17 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1.1 |
| 有所見者率(%) | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |

④ 集団健診

<男性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～59 | 60～69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 6,131 | 6,702 | 5,172 | 4,880 | 4,533 | 2,016 | 395 | 29,829 | 90.8 |
| B1 | 1,015 | 683 | 294 | 170 | 193 | 45 | 13 | 2,413 | 7.3 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
| B2 | 106 | 72 | 44 | 62 | 66 | 31 | 7 | 388 | 1.2 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 19 | 16 | 29 | 53 | 56 | 28 | 6 | 207 | 0.6 |
| 受診者数 | 7,271 | 7,473 | 5,539 | 5,165 | 4,848 | 2,120 | 421 | 32,837 | 100.0 |
| 有所見者数 | 125 | 88 | 73 | 115 | 122 | 59 | 13 | 595 | 1.8 |
| 有所見者率(%) | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | |

<女性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～59 | 60～69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|
| A | 4,162 | 3,884 | 4,012 | 3,900 | 4,383 | 2,538 | 430 | 23,309 | 89.7 |
| B1 | 1,054 | 593 | 423 | 169 | 66 | 28 | 7 | 2,340 | 9.0 |
| B2 | 123 | 75 | 38 | 14 | 10 | 18 | 5 | 283 | 1.1 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 21 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 67 | 0.3 |
| 受診者数 | 5,360 | 4,562 | 4,481 | 4,089 | 4,471 | 2,590 | 446 | 25,999 | 100.0 |
| 有所見者数 | 144 | 85 | 46 | 20 | 22 | 24 | 9 | 350 | 1.3 |
| 有所見者率(%) | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | |