

(2)上部消化管内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2 以上

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	5	143	209	105	39	2	1	504	6.6
B1	9	338	898	734	463	69	16	2527	33.0
B2	4	254	870	1222	1298	461	75	4184	54.6
C	0	1	6	17	11	7	3	45	0.6
D	0	14	43	67	74	18	3	219	2.9
E	0	14	41	59	53	13	2	182	2.4
受診者数(人)	18	764	2067	2204	1938	570	100	7661	100.0
有所見者率(%)	22.2	37.0	46.4	61.9	74.1	87.5	83.0	60.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	15	165	317	170	68	6	1	742	11.1
B1	10	341	994	917	469	95	12	2838	42.5
B2	3	125	592	940	905	294	41	2900	43.4
C	0	2	6	3	3	0	0	14	0.2
D	0	6	25	44	40	10	4	129	1.9
E	0	5	12	16	17	7	1	58	0.9
受診者数(人)	28	644	1946	2090	1502	412	59	6681	100.0
有所見者率(%)	10.7	21.4	32.6	48.0	64.2	75.5	78.0	46.4	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	55	70	39	23	5	0	194	6.2
B1	4	99	309	344	232	60	12	1060	33.6
B2	5	52	235	462	526	358	106	1744	55.3
C	0	0	2	6	4	6	1	19	0.6
D	0	3	13	15	30	10	6	77	2.4
E	1	0	16	16	20	4	1	58	1.8
受診者数(人)	12	209	645	882	835	443	126	3152	100.0
有所見者率(%)	50.0	26.3	41.2	56.6	69.5	85.3	90.5	60.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	16	34	32	13	6	1	103	8.6
B1	0	22	106	121	123	48	9	429	35.8
B2	3	10	54	153	209	157	29	615	51.4
C	0	0	1	0	1	0	0	2	0.2
D	0	0	3	7	9	11	2	32	2.7
E	0	0	1	5	5	0	5	16	1.3
受診者数(人)	4	48	199	318	360	222	46	1197	100.0
有所見者率(%)	75.0	20.8	29.6	51.9	62.2	75.7	78.3	55.6	

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 一般健康診査

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	1	6	1	0	0	8	5.8
B1	7	30	15	8	1	61	44.5
B2	6	17	20	13	0	56	40.9
D	1	1	2	3	0	7	5.1
E	0	3	2	0	0	5	3.6
受診者数(人)	15	57	40	24	1	137	100.0
有所見者率(%)	46.7	36.8	60.0	66.7	0.0	49.6	

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	2	21	8	1	0	32	18.1
B1	7	52	19	1	0	79	44.6
B2	5	32	20	3	1	61	34.5
C	0	2	0	0	0	2	1.1
D	0	1	0	0	0	1	0.6
E	0	1	1	0	0	2	1.1
受診者数(人)	14	109	48	5	1	177	100.0
有所見者率(%)	35.7	33.0	43.8	60.0	100.0	37.3	

④ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 2次検査

<男性>

	40~49	合計(人)	比率(%)
B1	1	1	100.0
受診者数(人)	1	1	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	

<女性>

	30~39	40~49	50~59	合計(人)	比率(%)
B1	0	1	1	2	33.3
B2	1	1	1	3	50.0
D	0	0	1	1	16.7
受診者数(人)	1	2	3	6	100.0
有所見者率(%)	100.0	50.0	66.7	66.7	

⑤ 保険診療外来

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	1	0	0	0	1	0.7
B1	1	3	3	3	2	0	12	8.5
B2	4	10	24	24	14	5	81	57.0
C	0	0	1	0	1	1	3	2.1
D	4	3	13	13	8	1	42	29.6
E	1	0	1	1	0	0	3	2.1
受診者数(人)	10	16	43	41	25	7	142	100.0
有所見者率(%)	90.0	81.3	90.7	92.7	92.0	100.0	90.8	

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	0	0	0	0	1	1.2
B1	0	4	3	0	0	0	7	8.3
B2	3	4	11	23	9	3	53	63.1
C	0	1	3	1	0	0	5	6.0
D	0	4	4	8	2	0	18	21.4
受診者数(人)	3	14	21	32	11	3	84	100.0
有所見者率(%)	100.0	64.3	85.7	100.0	100.0	100.0	90.5	

<検査所見>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	5	143	209	105	39	2	1	504
食道ポリープ	0	10	23	26	20	4	1	84
食道隆起性病変	0	0	0	4	1	0	1	6
食道陥凹性病変	0	1	3	3	6	1	0	14
食道粘膜下腫瘍	0	4	19	26	20	11	6	86
食道炎	2	205	572	709	593	141	26	2248
食道潰瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
急性胃炎	4	266	888	1015	866	208	35	3282
慢性胃炎	3	170	564	884	1116	399	79	3215
胃潰瘍	0	1	2	5	8	3	0	19
胃潰瘍癒痕	0	2	26	67	78	41	9	223
胃ポリープ	3	127	519	664	533	134	23	2003
胃隆起性病変	0	2	5	9	12	4	0	32
胃陥凹性病変	0	3	8	24	25	1	1	62
胃粘膜下腫瘍	1	11	44	99	100	35	8	298
十二指腸炎	1	24	96	101	66	12	2	302
十二指腸潰瘍	0	5	11	14	3	1	0	34
十二指腸潰瘍癒痕	0	40	91	139	133	36	5	444
十二指腸ポリープ	0	3	22	36	50	13	1	125
十二指腸隆起性病変	0	0	3	12	3	4	0	22
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	15	11	19	4	0	49
ブルネル腺過形成	1	5	25	57	62	17	1	168
その他の病変	2	402	1195	1339	1199	436	59	4632
総計	22	1424	4340	5350	4954	1507	258	17855

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	15	165	317	170	68	6	1	742
食道ポリープ	0	8	45	44	22	4	1	124
食道隆起性病変	0	1	4	4	3	0	0	12
食道陥凹性病変	0	1	2	4	1	1	0	9
食道粘膜下腫瘍	0	3	5	17	11	4	0	40
食道炎	0	65	232	267	220	68	11	863
急性胃炎	6	173	642	857	593	171	23	2465
慢性胃炎	2	90	424	711	746	241	43	2257
胃潰瘍	0	1	1	6	4	1	0	13
胃潰瘍癒痕	0	2	13	22	28	8	2	75
胃ポリープ	4	218	801	923	561	151	19	2677
胃隆起性病変	0	0	3	5	7	4	0	19
胃陥凹性病変	0	2	5	13	6	4	1	31
胃粘膜下腫瘍	0	7	51	92	92	42	4	288
十二指腸炎	0	4	20	25	17	3	0	69
十二指腸潰瘍	0	1	4	3	3	0	0	11
十二指腸潰瘍癒痕	1	10	36	72	56	14	1	190
十二指腸ポリープ	0	0	11	14	7	2	0	34
十二指腸隆起性病変	0	0	2	4	4	2	1	13
十二指腸粘膜下腫瘍	0	1	3	9	7	4	0	24
ブルネル腺過形成	0	5	21	23	19	3	1	72
その他の病変	4	169	601	744	701	233	30	2482
総計	32	926	3243	4029	3176	966	138	12510

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	2	55	70	39	23	5	0	194
食道ポリープ	0	3	4	8	11	5	1	32
食道隆起性病変	0	0	0	0	4	0	1	5
食道陥凹性病変	0	0	1	1	6	1	1	10
食道粘膜下腫瘍	0	2	5	10	8	8	3	36
食道炎	3	53	201	290	250	126	25	948
食道潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
急性胃炎	2	72	287	461	361	176	38	1397
慢性胃炎	2	41	161	328	468	325	104	1429
胃潰瘍	0	0	0	1	1	0	2	4
胃潰瘍癒痕	0	2	5	12	34	15	14	82
胃ポリープ	1	29	151	249	215	94	18	757
胃隆起性病変	0	0	2	3	2	3	3	13
胃陥凹性病変	0	2	5	5	10	8	1	31
胃粘膜下腫瘍	0	0	17	28	45	26	5	121
十二指腸炎	3	6	19	43	21	6	1	99
十二指腸潰瘍	0	0	3	2	0	1	1	7
十二指腸潰瘍癒痕	1	8	32	48	60	30	8	187
十二指腸ポリープ	0	0	4	11	18	4	2	39
十二指腸隆起性病変	0	0	1	3	3	2	0	9
十二指腸陥凹性病変	0	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	4	13	12	7	3	39
ブルネル腺過形成	0	0	9	21	31	14	3	78
その他の病変	4	88	364	541	542	307	100	1946
総計	18	361	1346	2117	2126	1163	334	7465

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	1	16	34	32	13	6	1	103
食道ポリープ	0	0	4	6	2	3	0	15
食道隆起性病変	0	0	1	1	0	0	0	2
食道陥凹性病変	0	0	1	0	0	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	5	3	2	0	10
食道炎	0	4	28	48	64	42	13	199
急性胃炎	0	10	74	123	144	94	23	468
慢性胃炎	3	11	34	115	189	135	26	513
胃潰瘍	0	0	0	2	1	1	0	4
胃潰瘍癒痕	0	0	0	1	4	6	2	13
胃ポリープ	0	11	75	134	109	71	11	411
胃隆起性病変	0	0	0	2	1	2	0	5
胃陥凹性病変	0	0	1	0	3	3	1	8
胃粘膜下腫瘍	0	1	8	17	25	19	7	77
十二指腸炎	0	0	0	5	4	2	0	11
十二指腸潰瘍	0	0	1	0	1	0	0	2
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	3	12	14	5	4	38
十二指腸ポリープ	0	0	0	2	2	2	0	6
十二指腸隆起性病変	0	0	0	0	1	1	0	2
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	3	2	0	0	5
ブルネル腺過形成	0	0	2	3	5	1	1	12
その他の病変	3	9	63	132	157	130	30	524
総計	7	62	329	643	744	526	119	2430

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 一般健康診査

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	1	6	1	0	0	8
食道ポリープ	1	1	0	0	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	3	0	0	3
食道炎	3	19	14	5	0	41
急性胃炎	8	21	20	12	1	62
慢性胃炎	5	12	12	14	1	44
胃潰瘍癒痕	0	1	1	1	0	3
胃ポリープ	2	13	7	7	0	29
胃陥凹性病変	0	0	1	1	0	2
胃粘膜下腫瘍	0	0	6	0	0	6
十二指腸炎	0	3	2	1	0	6
十二指腸潰瘍	0	1	0	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	1	3	0	2	0	6
十二指腸ポリープ	0	0	0	1	0	1
十二指腸隆起性病変	1	0	0	1	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	1
ブルネル腺過形成	0	0	0	1	0	1
その他の病変	10	33	24	18	0	85
総計	32	113	91	65	2	303

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	2	21	8	1	0	32
食道ポリープ	1	5	3	0	0	9
食道炎	0	13	6	2	1	22
急性胃炎	5	42	16	2	0	65
慢性胃炎	2	19	14	1	0	36
胃潰瘍癒痕	0	1	2	0	0	3
胃ポリープ	7	41	18	1	1	68
胃陥凹性病変	0	1	0	0	0	1
胃粘膜下腫瘍	1	3	2	0	0	6
十二指腸潰瘍癒痕	0	2	1	1	0	4
十二指腸ポリープ	0	1	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	1
ブルネル腺過形成	0	1	0	0	0	1
その他の病変	2	24	10	0	2	38
総計	20	174	81	8	4	287

④ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 2次検査

<男性>

	40~49	合計 (人)
食道炎	1	1
その他の病変	1	1
総計	2	2

<女性>

	30~39	40~49	50~59	合計 (人)
急性胃炎	0	2	2	4
慢性胃炎	1	1	2	4
胃陥凹性病変	0	0	1	1
十二指腸潰瘍	0	0	1	1
その他の病変	0	0	2	2
総計	1	3	8	12

⑤ 保険診療外来

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)
異常なし	0	0	1	0	0	0	1
食道ポリープ	2	0	2	1	1	0	6
食道隆起性病変	0	0	0	0	1	0	1
食道陥凹性病変	0	0	0	1	1	0	2
食道粘膜下腫瘍	3	1	1	1	0	1	7
食道炎	4	3	13	9	3	0	32
急性胃炎	5	11	17	16	12	3	64
慢性胃炎	8	13	39	39	26	6	131
胃潰瘍	1	1	1	0	0	0	3
胃潰瘍癒痕	3	3	4	5	6	2	23
胃ポリープ	1	2	8	7	6	1	25
胃隆起性病変	0	0	2	4	0	0	6
胃陥凹性病変	0	2	10	7	7	1	27
胃粘膜下腫瘍	1	1	0	2	2	0	6
十二指腸炎	0	1	2	0	1	1	5
十二指腸潰瘍	2	0	1	1	0	0	4
十二指腸潰瘍癒痕	1	0	4	3	7	0	15
十二指腸ポリープ	0	0	1	3	1	0	5
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	1
ブルネル腺過形成	0	0	2	1	0	0	3
その他の病変	6	9	24	24	15	8	86
総計	37	47	132	125	89	23	453

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)
異常なし	0	1	0	0	0	0	1
食道ポリープ	0	1	1	1	0	0	3
食道陥凹性病変	0	1	1	1	0	0	3
食道粘膜下腫瘍	0	2	0	1	0	0	3
食道炎	0	1	3	3	0	1	8
急性胃炎	0	6	7	14	8	2	37
慢性胃炎	3	4	16	24	9	2	58
胃潰瘍癒痕	0	0	0	2	1	0	3
胃ポリープ	0	3	6	15	2	1	27
胃隆起性病変	0	0	1	1	0	0	2
胃陥凹性病変	0	0	0	4	1	0	5
胃粘膜下腫瘍	1	1	2	6	3	0	13
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	2	2	0	1	5
十二指腸隆起性病変	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	1	0	0	2
ブルネル腺過形成	0	1	1	0	0	0	2
その他の病変	2	9	4	14	11	6	46
総計	6	30	45	89	36	13	219

<胃組織検査結果>

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
Group I	12	31	58	57	15	3	176	85.9
Group II	1	1	1	0	2	0	5	2.4
Group III	0	0	0	3	1	0	4	2.0
Group IV	0	0	0	3	0	1	4	2.0
Group V	0	1	2	3	4	0	10	4.9
その他	0	1	1	2	1	1	6	2.9
受診者数(人)	13	34	62	68	23	5	205	100.0

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
Group I	3	15	33	30	8	2	91	83.5
Group II	0	2	1	1	1	0	5	4.6
Group IV	0	0	0	0	1	0	1	0.9
Group V	0	3	1	0	0	0	4	3.7
その他	1	0	2	3	2	0	8	7.3
受診者数(人)	4	20	37	34	12	2	109	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他 : 検体不適