

**(4)全大腸内視鏡検査**

2日ドック総合+消化器コース、1日ドック消化器コースの希望者、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

## ① 1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	2	2	0	1	5	35.7
B1	3	1	2	0	6	42.9
B2	1	1	0	0	2	14.3
D	0	0	0	1	1	7.1
受診者数(人)	6	4	2	2	14	100.0
有所見者率(%)	16.7	25.0	0.0	50.0	21.4	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	2	1	0	1	0	4	57.1
B1	0	0	2	0	0	2	28.6
B2	0	0	0	0	1	1	14.3
受診者数(人)	2	1	2	1	1	7	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	14.3	

## ② 2日ドック総合+消化器コース

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	8	7	3	7	1	27	21.4
B1	0	2	4	13	11	4	34	27.0
B2	0	1	6	20	19	4	50	39.7
D	0	1	6	3	4	1	15	11.9
受診者数(人)	1	12	23	39	41	10	126	100.0
有所見者率(%)	0.0	16.7	52.2	59.0	56.1	50.0	51.6	

<女性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	5	4	4	1	14	63.6
B1	3	0	1	0	4	18.2
B2	0	2	1	0	3	13.6
D	0	1	0	0	1	4.5
受診者数(人)	8	7	6	1	22	100.0
有所見者率(%)	0.0	42.9	16.7	0.0	18.2	

## ③ 保険診療外来

## &lt;男性&gt;

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	1	3	3	2	1	0	10	33.3
B1	0	2	1	3	1	1	8	26.7
B2	0	0	2	2	1	0	5	16.7
D	0	0	1	3	2	1	7	23.3
受診者数(人)	1	5	7	10	5	2	30	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	42.9	50.0	60.0	50.0	40.0	

## &lt;女性&gt;

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	1	2	3	1	1	0	8	53.3
B1	0	0	2	1	0	0	3	20.0
B2	0	0	1	0	0	1	2	13.3
D	0	0	0	1	1	0	2	13.3
受診者数(人)	1	2	6	3	2	1	15	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0	100.0	26.7	

## &lt;検査所見&gt;

## ① 1日ドック消化器コース（希望者）

## &lt;男性&gt;

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	2	2	0	1	5
痔核	0	0	0	1	1
大腸憩室	3	3	1	0	7
大腸ポリープ	2	1	0	2	5
その他の病変	0	0	1	0	1
総計	7	6	2	4	19

## &lt;女性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	2	1	0	1	0	4
痔核	0	0	1	0	0	1
大腸憩室	0	0	2	0	0	2
大腸ポリープ	0	0	0	0	1	1
総計	2	1	3	1	1	8

## ② 2日ドック総合+消化器コース

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	1	8	7	3	6	1	26
痔核	0	0	1	4	3	0	8
大腸憩室	0	3	7	24	19	7	60
潰瘍性病変	0	0	1	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	3	14	37	46	15	115
粘膜下腫瘍	0	0	1	1	0	0	2
その他の病変	0	0	5	8	10	0	23
総計	1	14	36	77	84	23	235

## &lt;女性&gt;

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	5	4	4	1	14
大腸憩室	3	0	1	0	4
大腸ポリープ	0	5	1	0	6
総計	8	9	6	1	24

## ③ 保険診療外来

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	3	3	2	1	0	10
痔核	0	0	1	5	1	1	8
大腸憩室	0	2	1	6	3	2	14
大腸炎	0	0	0	1	0	0	1
大腸ポリープ	0	0	2	6	4	2	14
表面陥凹型病変	0	0	1	0	0	0	1
その他の病変	0	0	1	1	1	1	4
総計	1	5	9	21	10	6	52

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	2	3	1	1	0	8
大腸憩室	0	0	1	1	0	1	3
大腸ポリープ	0	0	1	1	4	1	7
その他の病変	0	0	1	0	1	1	3
総計	1	2	6	3	6	3	21

## &lt;大腸組織検査結果&gt;

## &lt;男性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
Group I	0	3	0	1	0	4	44.4
Group III	1	1	1	1	1	5	55.6
受診者数 (人)	1	4	1	2	1	9	100.0

## &lt;女性&gt;

	50～59	合計(人)	比率(%)
Group III	1	1	100.0
受診者数 (人)	1	1	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌