

(5)便潜血

糞便中のヘモグロビン量は、特に下部消化管の出血性病変を伴う疾患において増大する。

便潜血検査は大腸がんなどの出血を伴う疾病の早期発見・治療のためのスクリーニング検査として有効な方法とされている。

有所見者はD以上とする。

<便潜血検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	32	1,097	3,463	4,170	3,011	1,147	170	13,090	95.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	49	130	211	177	64	16	648	4.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	33	1,146	3,593	4,381	3,188	1,211	186	13,738	100.0
有所見者数	1	49	130	211	177	64	16	648	4.7
有所見者率（％）	3.0	4.3	3.6	4.8	5.6	5.3	8.6	4.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	35	901	2,997	3,523	2,266	803	102	10,627	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	35	106	162	83	45	7	438	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	35	936	3,103	3,685	2,349	848	109	11,065	100.0
有所見者数	0	35	106	162	83	45	7	438	4.0
有所見者率（％）	0.0	3.7	3.4	4.4	3.5	5.3	6.4	4.0	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	5	165	585	762	774	535	121	2,947	95.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	8	31	27	38	32	13	149	4.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	173	616	789	812	567	134	3,096	100.0
有所見者数	0	8	31	27	38	32	13	149	4.8
有所見者率（％）	0.0	4.6	5.0	3.4	4.7	5.6	9.7	4.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	4	36	155	264	323	272	63	1,117	96.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	6	9	12	7	1	37	3.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	38	161	273	335	279	64	1,154	100.0
有所見者数	0	2	6	9	12	7	1	37	3.2
有所見者率（％）	0.0	5.3	3.7	3.3	3.6	2.5	1.6	3.2	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,290	2,775	3,249	2,424	2,160	449	13	12,360	95.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	38	102	130	146	135	65	2	618	4.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,328	2,877	3,379	2,570	2,295	514	15	12,978	100.0
有所見者数	38	102	130	146	135	65	2	618	4.8
有所見者率（％）	2.9	3.5	3.8	5.7	5.9	12.6	13.3	4.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,052	2,007	3,586	3,035	1,615	313	15	11,623	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	58	98	134	95	66	20	2	473	3.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,110	2,105	3,720	3,130	1,681	333	17	12,096	100.0
有所見者数	58	98	134	95	66	20	2	473	3.9
有所見者率（％）	5.2	4.7	3.6	3.0	3.9	6.0	11.8	3.9	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,590	2,299	2,872	2,526	1,972	619	159	12,037	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	38	74	95	97	110	58	17	489	3.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,628	2,373	2,967	2,623	2,082	677	176	12,526	100.0
有所見者数	38	74	95	97	10	58	17	489	3.9
有所見者率（％）	2.3	3.1	3.2	3.7	5.3	8.6	9.7	3.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	679	824	1,300	1,508	1,346	643	173	6,473	96.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	30	32	48	31	47	25	19	232	3.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	709	856	1,348	1,539	1,393	668	192	6,705	100.0
有所見者数	30	32	48	31	47	25	19	232	3.5
有所見者率（％）	4.2	3.7	3.6	2.0	3.4	3.7	9.9	3.5	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	1,557	3,060	2,311	1,972	259	0	9,159	94.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	60	122	141	125	43	0	491	5.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,617	3,182	2,452	2,097	302	0	9,650	100.0
有所見者数	0	60	122	141	125	43	0	491	5.1
有所見者率（％）	0.0	3.7	3.8	5.8	6.0	14.2	0.0	5.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	800	2,131	1,825	1,009	110	0	5,875	96.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	37	86	63	41	6	0	233	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	837	2,217	1,888	1,050	116	0	6,108	100.0
有所見者数	0	37	86	63	41	6	0	233	3.8
有所見者率（％）	0.0	4.4	3.9	3.3	3.9	5.2	0.0	3.8	