

(4) 尿酸

尿酸値の上昇により痛風になることがある。尿酸値の高い方は、アルコールの飲み過ぎや食事（魚貝類、肉類などの蛋白質、脂質の過剰摂取）など生活習慣に注意が必要である。

有所見者はB 2以上とする。

<尿酸検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	49	1,257	3,200	3,638	2,596	767	97	11,604	80.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	7	168	417	466	241	53	11	1,363	9.4
C	3	195	462	419	226	45	5	1,355	9.3
D	2	24	61	52	26	6	1	172	1.2
受診者数	61	1,644	4,142	4,575	3,089	871	114	14,496	100.0
有所見者数	12	387	940	937	493	104	17	2,890	19.9
有所見者率(%)	19.7	23.5	22.7	20.5	16.0	11.9	14.9	19.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	59	1,471	3,510	3,592	2,168	644	57	11,501	98.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	16	26	17	5	1	67	0.6
C	0	5	10	19	13	5	0	52	0.4
D	0	0	3	1	1	0	1	6	0.1
受診者数	59	1,478	3,539	3,638	2,199	654	59	11,626	100.0
有所見者数	0	7	29	46	31	10	2	125	1.1
有所見者率(%)	0.0	0.5	0.8	1.3	1.4	1.5	3.4	1.1	

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	197	506	905	857	485	115	3,072	81.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	17	66	108	80	44	9	325	8.6
C	1	32	83	111	61	31	8	327	8.7
D	0	5	14	12	9	0	0	40	1.1
受診者数	9	251	669	1,136	1,007	560	132	3,764	100.0
有所見者数	2	54	163	231	150	75	17	692	18.4
有所見者率(%)	22.2	21.5	24.4	20.3	14.9	13.4	12.9	18.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	78	189	377	512	298	48	1,505	98.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	3	3	4	1	11	0.7
C	0	0	0	3	1	1	2	7	0.5
D	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
受診者数	3	78	189	383	516	303	52	1,524	100.0
有所見者数	0	0	0	6	4	5	4	19	1.2
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	1.7	7.7	1.2	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,597	2,582	2,336	1,569	107	0	8,191	78.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	194	350	239	138	5	0	926	8.9
C	258	402	283	153	12	0	1,108	10.7
D	51	59	41	18	0	0	169	1.6
受診者数	2,100	3,393	2,899	1,878	124	0	10,394	100.0
有所見者数	503	811	563	309	17	0	2,203	21.2
有所見者率(%)	24.0	23.9	19.4	16.5	13.7	0.0	21.2	

<女性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,261	2,377	1,938	811	41	6,428	98.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	4	11	15	7	0	37	0.6
C	0	3	9	13	4	0	29	0.4
D	0	1	3	5	1	0	10	0.2
受診者数	0	1,269	2,400	1,971	823	41	6,504	100.0
有所見者数	0	8	23	33	12	0	76	1.2
有所見者率(%)	0.0	0.6	1.0	1.7	1.5	0.0	1.2	

④ 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3,356	4,223	3,376	3,614	3,500	1,701	295	20,065	80.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	390	528	417	388	338	139	14	2,214	8.9
C	359	565	483	451	334	131	21	2,344	9.4
D	70	94	80	52	45	17	5	363	1.5
受診者数	4,175	5,410	4,356	4,505	4,217	1,988	335	24,986	100.0
有所見者数	819	1,187	980	891	717	287	40	4,921	19.7
有所見者率(%)	19.6	21.9	22.5	19.8	17.0	14.4	11.9	19.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,525	3,448	3,146	3,316	3,814	2,400	305	18,954	98.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	14	12	14	29	46	40	9	164	0.9
C	6	7	8	19	20	18	7	85	0.4
D	0	2	1	3	2	1	0	9	0.0
受診者数	2,545	3,469	3,169	3,367	3,882	2,459	321	19,212	100.0
有所見者数	20	21	23	51	68	59	16	258	1.3
有所見者率(%)	0.8	0.6	0.7	1.5	1.8	2.4	5.0	1.3	