

(8) 24時間ホルター心電図 (オプション)

<ホルター心電図検査判定結果>

<男性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受診者数(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 |
| 有所見者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| 有所見者率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 67 | |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| B1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受診者数(人) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100 |
| 有所見者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有所見者率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

有所見者数はB2以上とする。

<要再検査・精密検査判定者所見内訳>

心室性期外収縮多源性

心室性期外収縮多発

Paf

PAC頻発

PAC連発(10～15連発)

<受診の動機>

- | | |
|-------------------|----|
| 1. 胸痛・しめつけ・胸部違和感 | 1名 |
| 2. 動悸 | 3名 |
| 3. 不整脈を感じる | 2名 |
| 4. 不整脈を指摘されたことがある | 1名 |
| 5. 不整脈内服中 | 1名 |
| 6. 念の為 | 1名 |
| 7. 家族歴が気になる | 1名 |

(延べ人数)