

(3)下部大腸内視鏡検査

大腸がん早期発見のため、ポリープ・がんの好発部位である直腸～S状結腸までを目的として内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率... B2以上

①1日ドック

<男性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| A | 12 | 118 | 290 | 386 | 386 | 112 | 7 | 1,311 | 62.6 |
| B1 | 1 | 6 | 29 | 62 | 78 | 30 | 5 | 211 | 10.1 |
| B2 | 1 | 12 | 72 | 142 | 198 | 47 | 3 | 475 | 22.7 |
| D | 0 | 3 | 11 | 30 | 45 | 6 | 0 | 95 | 4.5 |
| E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |
| 受診者数(人) | 14 | 140 | 402 | 620 | 708 | 195 | 15 | 2,094 | 100.0 |
| 有所見者率(%) | 7.1 | 11.4 | 20.6 | 27.7 | 34.5 | 27.2 | 20.0 | 27.3 | |

<女性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| A | 12 | 44 | 103 | 208 | 254 | 62 | 0 | 683 | 80.1 |
| B1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 29 | 16 | 3 | 66 | 7.7 |
| B2 | 0 | 2 | 17 | 18 | 42 | 8 | 2 | 89 | 10.4 |
| D | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1.8 |
| 受診者数(人) | 12 | 50 | 125 | 241 | 333 | 87 | 5 | 853 | 100.0 |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 8.0 | 13.6 | 9.1 | 15.0 | 10.3 | 40.0 | 12.2 | |

②2日ドック

<男性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| A | 15 | 161 | 458 | 515 | 486 | 225 | 38 | 1,898 | 61.3 |
| B1 | 0 | 14 | 43 | 91 | 124 | 74 | 8 | 354 | 11.4 |
| B2 | 0 | 23 | 127 | 249 | 237 | 88 | 13 | 737 | 23.8 |
| D | 1 | 4 | 17 | 42 | 32 | 11 | 1 | 108 | 3.5 |
| 受診者数(人) | 16 | 202 | 645 | 897 | 879 | 398 | 60 | 3,097 | 100.0 |
| 有所見者率(%) | 6.3 | 13.4 | 22.3 | 32.4 | 30.6 | 24.9 | 23.3 | 27.3 | |

<女性>

| | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| A | 4 | 54 | 168 | 267 | 309 | 127 | 17 | 946 | 75.9 |
| B1 | 0 | 1 | 13 | 29 | 47 | 27 | 10 | 127 | 10.2 |
| B2 | 1 | 2 | 15 | 38 | 53 | 40 | 3 | 152 | 12.2 |
| D | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 22 | 1.8 |
| 受診者数(人) | 5 | 57 | 202 | 341 | 417 | 195 | 30 | 1,247 | 100.0 |
| 有所見者率(%) | 20.0 | 3.5 | 10.4 | 13.2 | 14.6 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | |

＜検査所見＞

①1日人間ドック

＜男性＞

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 異常なし | 12 | 118 | 290 | 386 | 386 | 112 | 7 | 1,311 |
| 痔核 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 大腸憩室 | 0 | 3 | 16 | 58 | 102 | 37 | 5 | 221 |
| 大腸炎 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 大腸ポリープ | 0 | 16 | 113 | 243 | 338 | 69 | 3 | 782 |
| 隆起性病変 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 表面隆起型病変 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 粘膜下腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の病変 | 1 | 1 | 12 | 38 | 36 | 6 | 7 | 101 |
| 総計 | 14 | 142 | 444 | 730 | 874 | 227 | 22 | 2,453 |

＜女性＞

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 異常なし | 12 | 44 | 103 | 208 | 254 | 62 | 0 | 683 |
| 痔核 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 大腸憩室 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 14 | 3 | 44 |
| 大腸炎 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 大腸ポリープ | 0 | 3 | 21 | 23 | 65 | 7 | 2 | 121 |
| 表面隆起型病変 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 粘膜下腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他の病変 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 26 |
| 総計 | 12 | 50 | 130 | 247 | 354 | 92 | 5 | 890 |

②2日人間ドック

<男性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 異常なし | 15 | 161 | 458 | 515 | 486 | 225 | 38 | 1,898 |
| 痔核 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 33 |
| 大腸憩室 | 0 | 7 | 34 | 88 | 135 | 66 | 9 | 339 |
| 大腸炎 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 |
| 大腸ポリープ | 2 | 27 | 193 | 399 | 348 | 129 | 21 | 1,119 |
| 隆起性病変 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 表面隆起型病変 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 粘膜下腫瘍 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 14 |
| その他の病変 | 0 | 10 | 20 | 37 | 62 | 20 | 0 | 149 |
| 総計 | 17 | 208 | 716 | 1,054 | 1,063 | 451 | 72 | 3,581 |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) |
|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 異常なし | 4 | 54 | 168 | 267 | 309 | 127 | 17 | 946 |
| 痔核 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 大腸憩室 | 0 | 0 | 3 | 19 | 34 | 25 | 6 | 87 |
| 大腸炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 大腸ポリープ | 1 | 3 | 23 | 55 | 70 | 48 | 6 | 206 |
| 隆起性病変 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 粘膜下腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の病変 | 0 | 1 | 11 | 14 | 16 | 13 | 3 | 58 |
| 総計 | 5 | 58 | 207 | 359 | 434 | 215 | 35 | 1,313 |