

(5) 心臓超音波検査

心臓超音波検査とは、体表面から超音波を使い、直接心臓の内部構造を観察し、心臓の動きや働きを調べる検査である。

1 日人間ドックの循環器コースのみ実施している。

有所見者数はB2 以上とする。

<心臓超音波検査判定結果>

① 1 日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1	2	9	12	3	1	0	28	26.2
B1	0	4	10	14	23	5	0	56	52.3
B2	0	1	2	8	6	4	0	21	19.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	1	1	0	0	2	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	1	7	21	35	33	10	0	107	100
有所見者数(人)	0	1	2	9	7	4	0	23	21.5
有所見者率(%)	0	14.3	9.5	25.7	21.2	40.0	0	21.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	0	1	2	3	0	0	6	12.2
B1	0	1	3	12	10	5	0	31	63.3
B2	0	0	0	3	6	2	0	11	22.4
C	0	0	0	0	0	1	0	1	2.1
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	0	1	4	17	19	8	0	49	100
有所見者数(人)	0	0	0	3	6	3	0	12	24.5
有所見者率(%)	0	0	0	17.6	31.6	37.5	0	24.5	

<心臓超音波検査所見一覧>

①1 日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率 (%)
正常範囲	1	2	9	12	3	1	0	28	11.3
三尖弁閉鎖不全	0	5	10	16	23	8	0	62	25.0
僧帽弁閉鎖不全	0	4	9	11	21	8	0	53	21.4
肺動脈弁閉鎖不全	0	4	7	9	8	5	0	33	13.3
大動脈弁閉鎖不全	0	1	0	3	12	4	0	20	8.1
大動脈弁狭窄	0	0	0	0	1	1	0	2	0.8
心室・心房拡大	0	2	5	8	8	0	0	23	9.3
上行大動脈拡大	0	0	0	5	4	1	0	10	4.0
壁運動消失、低下	0	0	0	1	0	0	0	1	0.4
心室壁肥厚	0	0	1	3	1	2	0	7	2.8
拡張能低下	0	0	0	1	1	0	0	2	0.8
その他	0	0	0	5	2	0	0	7	2.8

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率 (%)
正常範囲	0	0	1	2	3	0	0	6	5.2
三尖弁閉鎖不全	0	1	3	15	15	8	0	42	36.2
僧帽弁閉鎖不全	0	1	2	14	10	5	0	32	27.6
肺動脈弁閉鎖不全	0	1	2	6	4	6	0	19	16.4
大動脈弁閉鎖不全	0	0	0	2	3	3	0	8	6.9
心室、心房拡大	0	0	1	1	0	0	0	2	1.7
上行大動脈拡大	0	0	0	0	0	1	0	1	0.9
壁運動消失、低下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心室壁肥厚	0	0	0	0	2	0	0	2	1.7
拡張能低下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	2	1	0	4	3.4