

(5)便潜血

糞便中のヘモグロビン量は、特に下部消化管の出血性病変を伴う疾患において増大する。
便潜血検査は大腸がんなどの出血を伴う疾病の早期発見・治療のためのスクリーニング検査
として有効な方法とされている。
有所見者はD以上とする。

<便潜血検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	26	1,298	3,679	4,317	2,957	962	125	13,364	95.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	52	133	180	147	68	15	595	4.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	26	1,350	3,812	4,497	3,104	1,030	140	13,959	100.0
有所見者数	0	52	133	180	147	68	15	595	4.3
有所見者率(%)	0.0	3.9	3.5	4.0	4.7	6.6	10.7	4.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	31	972	3,058	3,583	2,257	655	65	10,621	96.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	29	123	127	76	44	5	405	3.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	32	1,001	3,181	3,710	2,333	699	70	11,026	100.0
有所見者数	1	29	123	127	76	44	5	405	3.7
有所見者率(%)	3.1	2.9	3.9	3.4	3.3	6.3	7.1	3.7	

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	9	194	638	860	856	510	110	3,177	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	5	21	34	36	31	7	134	4.0
受診者数	9	199	659	894	892	541	117	3,311	100.0
有所見者数	0	5	21	34	36	31	7	134	4.0
有所見者率（％）	0.0	2.5	3.2	3.8	4.0	5.7	6.0	4.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	3	41	185	325	354	240	49	1,197	94.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	5	5	21	11	1	45	3.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	44	204	336	378	256	50	1,272	100.0
有所見者数	0	2	5	5	21	11	1	45	3.5
有所見者率（％）	0.0	4.5	2.5	1.5	5.6	4.3	2.0	3.5	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,126	2,840	3,413	2,537	2,122	305	4	12,347	95.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	29	97	158	146	110	21	1	562	4.4
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,155	2,937	3,571	2,683	2,232	326	5	12,909	100.0
有所見者数	29	97	158	146	110	21	1	562	4.4
有所見者率（％）	2.5	3.3	4.4	5.4	4.9	6.4	20.0	4.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	830	2,353	3,453	2,872	1,401	172	10	11,091	96.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	48	111	121	110	44	8	1	443	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	878	2,464	3,574	2,982	1,445	180	11	11,534	100.0
有所見者数	48	111	121	110	44	8	1	443	3.8
有所見者率（％）	5.5	4.5	3.4	3.7	3.0	4.4	9.1	3.8	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,297	2,312	2,770	2,615	1,910	532	128	11,564	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	42	58	79	107	115	49	18	468	3.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,339	2,370	2,849	2,722	2,025	581	146	12,032	100.0
有所見者数	42	58	79	107	115	49	18	468	3.9
有所見者率（％）	3.1	2.4	2.8	3.9	5.7	8.4	12.3	3.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	571	895	1,356	1,545	1,353	621	127	6,468	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C		0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	26	34	46	50	55	41	7	259	3.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	597	929	1,402	1,595	1,408	662	134	6,727	100.0
有所見者数	26	34	46	50	55	41	7	259	3.9
有所見者率（％）	4.4	3.7	3.3	3.1	3.9	6.2	5.2	3.9	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,652	3,196	2,417	1,884	173	0	9,322	95.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	59	136	140	107	13	0	455	4.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,711	3,332	2,557	1,991	186	0	9,777	100.0
有所見者数	0	59	136	140	107	13	0	455	4.7
有所見者率 (%)	0.0	3.4	4.1	5.5	5.4	7.0	0.0	4.7	

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	0	839	2,027	1,710	865	62	0	5,503	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	47	77	74	30	2	0	230	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	886	2,104	1,784	895	64	0	5,733	100.0
有所見者数	0	47	77	74	30	2	0	230	4.0
有所見者率 (%)	0.0	5.3	3.7	4.1	3.4	3.1	0.0	4.0	