

(4) 全大腸内視鏡検査

2日ドック総合コース(全大腸内視鏡検査)、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 2日ドック総合コース(全大腸内視鏡検査)

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	4	7	11	9	2	33	26.0
B1	1	9	7	13	7	37	29.1
B2	1	7	21	14	2	45	35.4
D	1	3	1	7	0	12	9.4
受診者数(人)	7	26	40	43	11	127	100.0
有所見者率(%)	28.6	38.5	55.0	48.8	18.2	44.9	

<女性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	4	6	2	0	12	52.2
B1	1		3	1	5	21.7
B2	0	2	2	0	4	17.4
D	0	1	1	0	2	8.7
受診者数(人)	5	9	8	1	23	100.0
有所見者率(%)	0.0	33.3	37.5	0.0	26.1	

②保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	3	1	0	0	4	22.2
B1	2	0	1	0	3	16.7
B2	0	1	2	2	5	27.8
D	0	2	2	2	6	33.3
受診者数(人)	5	4	5	4	18	100.0
有所見者率(%)	0.0	75.0	80.0	100.0	61.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	2	1	0	0	1	4	33.3
B1	0	1	2	0	1	4	33.3
B2	0	0	0	1	2	3	25.0
D	0	0	1	0	0	1	8.3
受診者数(人)	2	2	3	1	4	12	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	33.3	100.0	50.0	33.3	

<検査所見>

① 2日ドック総合コース（全大腸内視鏡検査）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	4	7	11	9	2	33
痔核	0	1	3	4	1	9
大腸憩室	1	11	21	30	7	70
大腸炎	0	0	1	0	0	1
大腸ポリープ	1	19	37	43	3	103
表面隆起性病変	0	1	0	0	0	1
粘膜下腫瘍	1	0	0	3	0	4
その他の病変	1	4	5	8	2	20
総計	8	43	78	97	15	241

<女性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	4	6	2	0	12
痔核	0	1	1	0	2
大腸憩室	0	1	2	1	4
大腸炎	1	1	1	0	3
大腸ポリープ	0	1	3	0	4
隆起性病変	0	1	0	0	1
その他の病変	0	1	1	0	2
総計	5	12	10	1	28

② 保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	3	1	0	0	4
痔核	1	1	1	0	3
大腸憩室	0	2	3	2	7
大腸ポリープ	1	5	7	9	22
隆起性病変	0	0	1	0	1
表面隆起型病変	0	0	0	1	1
粘膜下腫瘍	0	0	0	1	1
総計	5	9	12	13	39

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	2	1	0	0	1	4
痔核	0	0	2	0	1	3
大腸憩室	0	0	1	1	3	5
大腸炎	0	1	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	0	2	2	5	9
粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	1
その他の病変	0	0	2	1	0	3
総計	2	2	7	4	11	26

<大腸組織検査結果>

<男性>

	60～69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	1	50.0
Group III	1	1	50.0
受診者数 (人)	2	2	100.0

<女性>

対象者なし

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌