

**(4) 頸動脈超音波検査**

頸動脈超音波検査は心臓から脳につながる血管の動脈硬化の程度を調べる検査である。

人間ドックオプション検査、施設内セレクト健診、施設外健診にて実施している。

有所見者数はB2以上とする。

## &lt; 頸動脈超音波検査判定結果 &gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt; 男性 &gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	29	107	119	52	17	0	326	20.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	15	121	327	474	227	40	1,204	77.2
C	0	0	1	4	13	7	0	25	1.6
D	0	0	1	1	2	0	0	4	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2	44	230	451	541	251	40	1,559	100.0
有所見者数(人)	0	15	123	332	489	234	40	1,233	79.1
有所見者率(%)	0.0	34.1	53.5	73.6	90.4	93.2	100.0	79.1	

## &lt; 女性 &gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	19	76	134	79	17	2	327	26.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	8	51	307	345	172	25	908	73.0
C	0	0	0	2	4	2	0	8	0.6
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	27	127	443	428	191	27	1,243	100.0
有所見者数(人)	0	8	51	309	349	174	25	916	73.7
有所見者率(%)	0.0	29.6	40.2	69.8	81.5	91.1	92.6	73.7	

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	21	55	59	30	8	3	176	19.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	3	81	160	230	206	44	725	79.1
C	0	0	0	5	2	6	1	14	1.5
D	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	24	136	224	263	220	48	916	100.0
有所見者数(人)	1	3	81	165	233	212	45	740	80.8
有所見者率(%)	100.0	12.5	59.6	73.7	88.6	96.4	93.8	80.8	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	1	4	26	17	21	8	1	78	22.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	10	49	92	106	17	274	77.4
C	0	0	0	1	1	0	0	2	0.6
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	4	36	67	114	114	18	354	100.0
有所見者数(人)	0	0	10	50	93	106	17	276	78.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	27.8	74.6	81.6	93.0	94.4	78.0	

## ③ 施設内健診

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	2	4	3	3	0	0	12	52.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	2	2	3	2	0	9	39.1
C	0	0	0	0	2	0	0	2	8.7
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	2	6	5	8	2	0	23	100.0
有所見者数(人)	0	0	2	2	5	2	0	11	47.8
有所見者率(%)	0.0	0.0	33.3	40.0	62.5	100.0	0.0	47.8	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	1	3	4	1	0	9	23.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	2	6	14	7	0	29	76.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	0	3	9	18	8	0	38	100.0
有所見者数(人)	0	0	2	6	14	7	0	29	76.3
有所見者率(%)	0.0	0.0	66.7	66.7	77.8	87.5	0.0	76.3	

## ④ 施設外健診

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1	52	36	10	14	0	113	33.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	28	54	73	63	0	218	64.3
C	0	0	0	0	4	3	0	7	2.1
D	0	0	0	0	1	0	0	1	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1	80	90	88	80	0	339	100.0
有所見者数(人)	0	0	28	54	78	66	0	226	66.7
有所見者率(%)	0.0	0.0	35.0	60.0	88.6	82.5	0.0	66.7	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1	26	7	32	12	0	78	38.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	5	13	44	62	0	125	61.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	2	31	20	76	74	0	203	100.0
有所見者数(人)	0	1	5	13	44	62	0	125	61.6
有所見者率(%)	0.0	50.0	16.1	65.0	57.9	83.8	0.0	61.6	

## &lt;頰動脈超音波検査所見一覧&gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	2	29	107	119	52	17	0	326	16.3
内中膜複合体肥厚	0	1	32	114	198	123	25	493	24.7
プラーク	0	15	114	319	467	220	39	1,174	58.9
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1
小計	2	45	254	552	717	360	64	1,994	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	19	76	134	79	17	2	327	23.2
内中膜複合体肥厚	0	0	5	46	80	51	14	196	13.9
プラーク	0	8	48	301	333	171	25	886	62.9
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小計	0	27	129	481	492	239	41	1,409	100.0

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	21	55	59	30	8	3	176	16.4
内中膜複合体肥厚	0	0	17	38	63	58	10	186	17.3
プラーク	1	3	76	157	223	204	44	708	65.9
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	2	1	0	3	0.3
その他	0	0	0	0	0	2	0	2	0.2
小計	1	24	148	254	318	273	57	1,075	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	1	4	26	17	21	8	1	78	18.7
内中膜複合体肥厚	0	0	2	10	26	29	6	73	17.5
プラーク	0	0	10	49	88	103	16	266	63.8
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小計	1	4	38	76	135	140	23	417	100.0

## ③ 施設内健診

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	2	4	3	3	0	0	12	34.3
内中膜複合体肥厚	0	0	2	0	2	0	0	4	11.4
プラーク	0	0	4	3	8	3	0	18	51.4
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	1	0	0	1	2.9
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小計	0	2	10	6	14	3	0	35	100.0

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	0	1	3	4	1	0	9	15.0
内中膜複合体肥厚	0	0	0	1	4	3	0	8	13.3
プラーク	0	0	2	5	22	14	0	43	71.7
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小計	0	0	3	9	30	18	0	60	100.0

## ④ 施設外健診

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	1	52	36	10	14	0	113	20.0
内中膜複合体肥厚	0	0	8	21	34	28	0	91	16.1
プラーク	0	0	28	81	138	111	0	358	63.5
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2
その他	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
小計	0	1	88	138	183	154	0	564	100.0

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
正常範囲	0	1	26	7	32	12	0	78	24.9
内中膜複合体肥厚	0	0	0	1	13	20	0	34	10.9
プラーク	0	1	5	17	72	106	0	201	64.2
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小計	0	2	31	25	117	138	0	313	100.0