

(2)上部消化管内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	125	233	145	63	16	0	588	7.4
B1	13	301	1,050	1,033	715	196	19	3,327	41.7
B2	8	166	716	1,039	1,143	566	77	3,715	46.6
C	0	0	2	4	5	4	0	15	0.2
D	0	8	27	53	60	32	8	188	2.4
E	0	5	30	39	40	22	1	137	1.7
受診者数(人)	27	605	2,058	2,313	2,026	836	105	7,970	100.0
有所見者率(%)	29.6	29.6	37.7	49.1	61.6	74.6	81.9	50.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	150	332	198	75	18	3	783	11.1
B1	5	344	1,212	1,231	715	183	15	3,705	52.5
B2	3	102	479	801	720	296	33	2,434	34.5
C	1	0	0	2	4	1	1	9	0.1
D	0	3	17	30	20	10	3	83	1.2
E	0	1	8	9	13	6	2	39	0.6
受診者数(人)	16	600	2,048	2,271	1,547	514	57	7,053	100.0
有所見者率(%)	25.0	17.7	24.6	37.1	48.9	60.9	68.4	36.4	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	29	65	45	28	8	1	178	6.9
B1	3	72	309	322	247	114	8	1,075	41.5
B2	1	37	190	288	355	301	70	1,242	48.0
C	0	0	1	2	2	1	2	8	0.3
D	0	4	7	9	14	11	7	52	2.0
E	0	1	5	9	10	5	3	33	1.3
受診者数(人)	6	143	577	675	656	440	91	2,588	100.0
有所見者率(%)	16.7	29.4	35.2	45.6	58.1	72.3	90.1	51.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	9	25	24	10	3	0	71	7.7
B1	1	15	103	130	120	61	15	445	48.1
B2	0	7	39	78	126	120	18	388	41.9
C	0	0	1	0	1	1	0	3	0.3
D	0	1	0	2	2	5	0	10	1.1
E	0	0	0	1	3	5	0	9	1.0
受診者数(人)	1	32	168	235	262	195	33	926	100.0
有所見者率(%)	0.0	25.0	23.8	34.5	50.4	67.2	54.5	44.3	

③ 保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	2	0	0	2	3.3
B1	0	3	0	1	1	0	5	8.2
B2	4	4	7	12	10	3	40	65.6
D	1	0	2	7	4	0	14	23.0
受診者数(人)	5	7	9	22	15	3	61	100.0
有所見者率(%)	100.0	57.1	100.0	86.4	93.3	100.0	88.5	

<女性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0.0
B1	1	0	1	2	4	15.4
B2	3	3	3	4	13	50.0
C	0	0	1	1	2	7.7
D	0	3	4	0	7	26.9
受診者数(人)	4	6	9	7	26	100.0
有所見者率(%)	75.0	100.0	88.9	71.4	84.6	

<検査所見>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	6	125	233	145	63	16	0	588
食道ポリープ	0	7	14	30	24	6	2	83
食道隆起性病変	0	0	6	3	2	2	0	13
食道陥凹性病変	0	0	1	0	4	1	0	6
食道粘膜下腫瘍	1	2	19	19	19	9	5	74
食道炎	6	139	570	698	592	213	24	2,242
食道潰瘍	0	1	0	0	0	0	0	1
急性胃炎	10	190	876	1,051	879	340	34	3,380
慢性胃炎	6	117	487	772	1,008	549	79	3,018
胃潰瘍	0	0	5	3	9	6	0	23
胃潰瘍癒痕	0	2	10	44	69	61	6	192
胃ポリープ	5	150	650	869	744	230	33	2,681
胃隆起性病変	0	1	7	14	9	5	4	40
胃陥凹性病変	0	0	11	16	22	11	2	62
胃粘膜下腫瘍	0	8	49	93	109	57	11	327
十二指腸炎	0	22	74	108	69	17	1	291
十二指腸潰瘍	0	1	4	7	5	2	0	19
十二指腸潰瘍癒痕	1	19	77	117	136	53	9	412
十二指腸ポリープ	0	3	11	31	37	19	1	102
十二指腸隆起性病変	0	2	2	12	8	0	0	24
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	1	3	0	0	4
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	10	18	27	12	0	67
ブルネル腺過形成	0	3	8	42	44	18	1	116
その他の病変	9	250	1,009	1,222	1,170	556	66	4,282
総計	44	1,042	4,133	5,315	5,052	2,183	278	18,047

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	7	150	332	198	75	18	3	783
食道ポリープ	0	8	36	59	23	5	0	131
食道隆起性病変	0	1	2	2	1	1	0	7
食道陥凹性病変	0	0	2	2	2	2	0	8
食道粘膜下腫瘍	0	2	6	16	11	3	0	38
食道炎	1	54	209	269	231	88	10	862
急性胃炎	4	155	599	799	598	214	22	2,391
慢性胃炎	3	72	352	652	654	268	34	2,035
胃潰瘍	0	0	1	2	0	0	0	3
胃潰瘍癒痕	0	2	6	22	26	13	3	72
胃ポリープ	3	257	1005	1175	713	208	25	3,386
胃隆起性病変	0	1	3	7	10	3	1	25
胃陥凹性病変	0	0	7	6	3	3	0	19
胃粘膜下腫瘍	0	10	54	85	105	42	5	301
十二指腸炎	0	2	11	29	17	6	1	66
十二指腸潰瘍	0	0	3	0	0	0	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	1	5	32	52	62	16	2	170
十二指腸ポリープ	0	1	7	10	13	3	0	34
十二指腸隆起性病変	0	0	3	2	4	1	0	10
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	4	11	8	2	0	25
ブルネル腺過形成	0	1	8	5	10	3	1	28
その他の病変	5	135	537	707	586	253	38	2,261
総計	24	856	3,219	4,110	3,152	1,152	145	12,658

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	2	29	65	45	28	8	1	178
食道ポリープ	0	0	7	4	7	3	0	21
食道隆起性病変	0	0	0	0	1	1	1	3
食道陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	1	1
食道粘膜下腫瘍	0	2	3	7	15	9	1	37
食道炎	1	33	182	191	176	116	21	720
急性胃炎	2	43	234	292	286	155	34	1,046
慢性胃炎	0	26	133	238	326	286	74	1,083
胃潰瘍	0	1	0	2	1	1	2	7
胃潰瘍癒痕	0	2	5	12	22	22	13	76
胃ポリープ	0	36	178	244	235	132	22	847
胃隆起性病変	0	0	3	3	3	6	0	15
胃陥凹性病変	0	1	3	3	4	6	3	20
胃粘膜下腫瘍	0	4	12	19	27	33	3	98
十二指腸炎	0	4	13	21	22	9	2	71
十二指腸潰瘍	0	0	0	2	2	2	0	6
十二指腸潰瘍癒痕	1	3	17	33	39	23	5	121
十二指腸ポリープ	0	0	3	15	8	9	0	35
十二指腸隆起性病変	0	1	1	1	3	2	2	10
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	2	3	5	4	1	15
ブルネル腺過形成	0	0	3	13	9	15	2	42
その他の病変	3	65	311	349	340	289	57	1,414
総計	9	250	1,175	1,497	1,559	1,131	245	5,866

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	0	9	25	24	10	3	0	71
食道ポリープ	0	0	3	5	1	2	0	11
食道隆起性病変	0	0	0	1	0	1	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	2	4	1	0	7
食道炎	0	1	16	30	61	29	7	144
急性胃炎	0	9	61	85	90	64	15	324
慢性胃炎	0	5	28	57	119	109	16	334
胃潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	4	3	0	7
胃ポリープ	1	8	77	117	102	87	15	407
胃隆起性病変	0	0	0	1	2	0	0	3
胃陥凹性病変	0	1	0	0	0	2	0	3
胃粘膜下腫瘍	0	1	9	18	13	19	2	62
十二指腸炎	0	1	1	2	0	1	0	5
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	2	6	9	5	1	23
十二指腸ポリープ	0	0	1	2	1	1	0	5
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	2	3	2	0	7
ブルンネル腺過形成	0	0	1	0	1	0	1	3
その他の病変	0	6	36	77	107	92	22	340
総計	1	41	260	429	527	423	79	1,760

③保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	0	0	2	0	0	2
食道陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	1	0	0	0	0	1
食道炎	0	2	2	4	5	1	14
急性胃炎	2	2	5	9	4	2	24
慢性胃炎	5	2	5	18	10	2	42
胃潰瘍癒痕	0	1	0	3	3	2	9
胃ポリープ	0	2	3	3	9	0	17
胃隆起性病変	0	1	1	2	0	0	4
胃陥凹性病変	1	0	1	3	3	1	9
胃粘膜下腫瘍	0	1	0	0	1	0	2
十二指腸炎	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	2	1	1	3	2	0	9
十二指腸隆起性病変	0	0	1	1	0	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	0	1
その他の病変	0	3	3	8	7	2	23
総計	10	16	24	56	45	10	161

<女性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	0	0	0	0	0
食道ポリープ	1	0	0	0	1
食道陥凹性病変	0	1	1	1	3
食道粘膜下腫瘍	0	1	0	0	1
食道炎	2	0	1	1	4
急性胃炎	4	3	1	3	11
慢性胃炎	2	3	7	5	17
胃潰瘍癒痕	0	0	1	0	1
胃ポリープ	1	3	6	3	13
胃隆起性病変	0	0	2	0	2
十二指腸潰瘍癒痕	0	1	0	1	2
十二指腸ポリープ	0	1	0	0	1
その他の病変	2	2	5	2	11
総計	12	15	24	16	67

<食道・胃・十二指腸組織検査結果>

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	9	25	46	52	29	9	170	82.1
Group II	0	0	1	0	1	0	2	1.0
Group III	1	0	1	2	0	0	4	1.9
Group IV	0	0	1	3	1	0	5	2.4
Group V	0	2	2	2	2	1	9	4.3
その他	2	3	2	5	3	2	17	8.2
受診者数(人)	12	30	53	64	36	12	207	100.0

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	3	11	18	16	9	1	58	77.3
Group II	0	0	0	1	0	0	1	1.3
Group V	0	0	0	0	1	0	1	1.3
その他	0	1	6	4	4	0	15	20.0
受診者数(人)	3	12	24	21	14	1	75	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他 : 食道病変、十二指腸病変などグループ分類されないもの