

(5)便潜血

糞便中のヘモグロビン量は、特に下部消化管の出血性病変を伴う疾患において増大する。

便潜血検査は大腸がんなどの出血を伴う疾病の早期発見・治療のためのスクリーニング検査として有効な方法とされている。

有所見者はD以上とする。

<便潜血検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	23	1,185	3,407	4,027	2,881	1,056	147	12,735	95.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	53	146	210	160	54	15	639	4.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	33	1,238	3,553	4,237	3,041	1,110	162	13,374	100.0
有所見者数	1	53	146	210	160	54	15	639	4.8
有所見者率(%)	3.0	4.3	4.1	5.0	5.3	4.9	9.3	4.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	22	950	2,985	3,599	2,160	648	84	10,448	95.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	3	50	129	143	82	36	5	448	4.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	25	1,000	3,114	3,742	2,242	684	89	10,896	100.0
有所見者数	3	50	129	143	82	36	5	448	4.1
有所見者率(%)	12.0	5.0	4.1	3.8	3.7	5.3	5.6	4.1	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	6	137	557	663	636	407	85	2,491	95.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	5	22	23	26	38	10	124	4.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	142	579	686	662	445	95	2,615	100.0
有所見者数	0	5	22	23	26	38	10	124	4.7
有所見者率（%）	0.0	3.5	3.8	3.4	3.9	8.5	10.5	4.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1	27	155	227	257	191	31	889	96.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	6	9	9	8	2	35	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1	28	161	236	266	199	33	924	100.0
有所見者数	0	1	6	9	9	8	2	35	3.8
有所見者率（%）	0.0	3.6	3.7	3.8	3.4	4.0	6.1	3.8	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,360	2,681	3,148	2,353	2,129	490	21	12,182	95.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	43	107	147	137	135	49	0	618	4.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,403	2,788	3,295	2,490	2,264	539	21	12,800	100.0
有所見者数	43	107	147	137	135	49	0	618	4.8
有所見者率（%）	3.1	3.8	4.5	5.5	6.0	9.1	0.0	4.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,052	2,059	3,519	3,018	1,721	357	15	11,742	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	59	92	135	110	64	24	2	486	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,111	2,151	3,654	3,128	1,785	381	17	12,228	100.0
有所見者数	59	92	135	110	64	24	2	486	4.0
有所見者率（%）	5.3	4.3	3.7	3.5	3.6	6.3	11.8	4.0	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,475	2,289	2,865	2,652	1,960	636	174	12,051	95.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	43	85	111	105	111	55	14	524	4.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,518	2,374	2,976	2,757	2,071	691	188	12,575	100.0
有所見者数	43	85	111	105	111	55	14	524	4.2
有所見者率（%）	2.8	3.6	3.7	3.8	5.4	8.0	7.4	4.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	756	866	1,430	1,494	1,296	580	185	6,607	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	25	38	53	56	49	25	26	272	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	781	904	1,483	1,550	1,345	605	211	6,879	100.0
有所見者数	25	38	53	56	49	25	26	272	4.0
有所見者率（%）	3.2	4.2	3.6	3.6	3.6	4.1	12.3	4.0	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1,520	3,000	2,232	1,935	297	0	8,984	94.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	70	149	130	125	30	0	504	5.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,590	3,149	2,362	2,060	327	0	9,488	100.0
有所見者数	0	70	149	130	125	30	0	504	5.3
有所見者率(%)	0.0	4.4	4.7	5.5	6.1	9.2	0.0	5.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	828	2,147	1,853	1,066	136	0	6,030	96.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	42	72	58	43	2	0	217	3.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	870	2,219	1,911	1,109	138	0	6,247	100.0
有所見者数	0	42	72	58	43	2	0	217	3.5
有所見者率(%)	0.0	4.8	3.2	3.0	3.9	1.4	0.0	3.5	