

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	6	161	486	579	622	274	24	2,152	92.4
B1	1	20	39	52	42	20	4	178	7.6
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	181	525	631	664	294	28	2,330	100.0
有所見者数	1	20	39	52	42	20	4	178	7.6
有所見者率(%)	14.3	11.0	7.4	8.2	6.3	6.8	14.3	7.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	82	277	284	245	99	14	1,003	91.9
B1	0	7	18	26	26	10	1	88	8.1
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	89	295	310	271	109	15	1,091	100.0
有所見者数	0	7	18	26	26	10	1	88	8.1
有所見者率(%)	0.0	7.9	6.1	8.4	9.6	9.2	6.7	8.1	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	6	133	560	658	616	325	45	2,343	95.4
B1	0	11	25	37	26	10	4	113	4.6
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	144	585	695	642	335	49	2,456	100.0
有所見者数	0	11	25	37	26	10	4	113	4.6
有所見者率(%)	0.0	7.6	4.3	5.3	4.0	3.0	8.2	4.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	1	29	169	230	236	116	16	797	95.9
B1	0	3	1	8	11	9	2	34	4.1
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1	32	170	238	247	125	18	831	100.0
有所見者数	0	3	1	8	11	9	2	34	4.1
有所見者率(%)	0.0	9.4	0.6	3.4	4.5	7.2	11.1	4.1	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	32	68	37	37	6	0	186	83.8
B1	0	6	11	12	5	2	0	36	16.2
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	38	79	49	42	8	0	222	100.0
有所見者数	0	6	11	12	5	2	0	36	16.2
有所見者率（％）	0.0	15.8	13.9	24.5	11.9	25.0	0.0	16.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	51	108	61	33	4	0	263	83.5
B1	0	12	14	16	9	1	0	52	16.5
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	63	122	77	42	5	0	315	100.0
有所見者数	0	12	14	16	9	1	0	52	16.5
有所見者率（％）	0.0	19.0	11.5	20.8	21.4	20.0	0.0	16.5	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	7	17	121	71	17	5	1	239	89.5
B1	1	3	13	9	2	0	0	28	10.5
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	8	20	134	80	19	5	1	267	100.0
有所見者数	1	3	13	9	2	0	0	28	10.5
有所見者率（%）	12.5	15.0	9.7	11.3	10.5	0.0	0.0	10.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	3	10	25	21	16	2	0	77	91.7
B1	0	1	1	3	1	1	0	7	8.3
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	11	26	24	17	3	0	84	100.0
有所見者数	0	1	1	3	1	1	0	7	8.3
有所見者率（%）	0.0	9.1	3.8	12.5	5.9	33.3	0.0	8.3	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	20	52	23	28	6	0	129	83.2
B1	0	5	8	9	3	1	0	26	16.8
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	25	60	32	31	7	0	155	100.0
有所見者数	0	5	8	9	3	1	0	26	16.8
有所見者率 (%)	0.0	20.0	13.3	28.1	9.7	14.3	0.0	16.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	27	68	30	17	2	0	144	81.4
B1	0	7	6	11	7	2	0	33	18.6
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	34	74	41	24	4	0	177	100.0
有所見者数	0	7	6	11	7	2	0	33	18.6
有所見者率 (%)	0.0	20.6	8.1	26.8	29.2	50.0	0.0	18.6	