

10. 婦人科

(1) 子宮頸部細胞診

子宮の入口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査である。
2020(令和2)年度より結果はベセスダ分類を記載し、NILM 以外は有所見者とする。

| ベセスダ分類 | 推定病変 | 用語説明 | 当センター 判定区分 |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 陰性 (NILM) | 微生物 | | 正常範囲 |
| | その他の非腫瘍性所見 | | |
| ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い | 意義不明な異型扁平上皮細胞 | 要精密検査 |
| ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い | HSIL を除外できない 異型扁平上皮細胞 | |
| LSIL | HPV感染 | 軽度扁平上皮内病変 | |
| | 軽度異形成 | | |
| HSIL | 中等度異形成 | 高度扁平上皮内病変 | |
| | 高度異形成 | | |
| | 上皮内癌 | | |
| | 微小浸潤扁平上皮癌疑い | | |
| SCC | 扁平上皮癌 | 扁平上皮癌 | |
| AGC | 腺異型または 腺癌疑い | 異型腺細胞 | |
| AIS | 上皮内腺癌 | 上皮内腺癌 | |
| Adeno carcinoma | 腺癌 | 腺癌 | |
| Other malignancy | その他の悪性腫瘍 | その他の悪性腫瘍 | |

＜子宮がん検診頸部細胞診判定結果＞

① 1日人間ドック

| ベセスダ分類 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| NILM | 16 | 617 | 2,252 | 2,577 | 1,453 | 421 | 27 | 7,363 | 98.69 |
| ASC-US | 0 | 9 | 22 | 19 | 8 | 2 | 0 | 60 | 0.80 |
| ASC-H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 |
| LSIL | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.24 |
| HSIL | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.20 |
| SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AGC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 |
| AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adeno ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| Other malign. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 判定不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 受診者数 | 16 | 635 | 2,292 | 2,603 | 1,465 | 423 | 27 | 7,461 | 100.00 |
| 有所見者数 | 0 | 18 | 40 | 26 | 12 | 2 | 0 | 98 | 1.31 |
| 有所見者率 (%) | 0.00 | 2.83 | 1.75 | 1.00 | 0.82 | 0.47 | 0.00 | 1.31 | |

② 2日人間ドック

| ベセスダ分類 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| NILM | 1 | 24 | 95 | 142 | 134 | 103 | 16 | 515 | 98.85 |
| ASC-US | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.58 |
| ASC-H | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 |
| LSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.19 |
| SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adeno ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Other malign. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 判定不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 受診者数 | 1 | 24 | 100 | 142 | 135 | 103 | 16 | 521 | 100.00 |
| 有所見者数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.15 |
| 有所見者率 (%) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |

③ 施設内健診

| ベセスダ分類 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| NILM | 694 | 1,322 | 2,573 | 2,119 | 1,185 | 281 | 13 | 8,187 | 98.32 |
| ASC-US | 16 | 15 | 19 | 18 | 12 | 1 | 0 | 81 | 0.97 |
| ASC-H | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.10 |
| LSIL | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.29 |
| HSIL | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0.26 |
| SCC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 |
| AGC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 |
| AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adeno ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Other malig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 判定不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 受診者数 | 720 | 1,349 | 2,612 | 2,150 | 1,199 | 284 | 13 | 8,327 | 100.00 |
| 有所見者数 | 26 | 26 | 38 | 30 | 14 | 3 | 0 | 137 | 1.65 |
| 有所見者率 (%) | 3.61 | 1.93 | 1.45 | 1.40 | 1.17 | 1.06 | 0.00 | 1.65 | |

④ 施設外健診

| ベセスダ分類 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| NILM | 175 | 884 | 1,317 | 1,195 | 2,346 | 2,447 | 640 | 9,004 | 99.27 |
| ASC-US | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | 43 | 0.47 |
| ASC-H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| LSIL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.09 |
| HSIL | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.13 |
| SCC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| AGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adeno ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Other malig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 判定不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 受診者数 | 180 | 893 | 1,331 | 1,209 | 2,359 | 2,457 | 641 | 9,070 | 100.00 |
| 有所見者数 | 5 | 9 | 13 | 14 | 13 | 10 | 1 | 65 | 0.72 |
| 有所見者率 (%) | 2.78 | 1.01 | 0.98 | 1.16 | 0.55 | 0.41 | 0.16 | 0.72 | |

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 [再掲]

| ベセスダ分類 | ～29 | 30～ 39 | 40～ 49 | 50～ 59 | 60～ 69 | 70～ 79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| NILM | 249 | 553 | 987 | 790 | 476 | 59 | 0 | 3,114 | 97.89 |
| ASC-US | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36 | 1.13 |
| ASC-H | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 |
| LSIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.31 |
| HSIL | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0.50 |
| SCC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
| AGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adeno ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Other malig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 判定不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 受診者数 | 261 | 566 | 1007 | 801 | 485 | 61 | 0 | 3,181 | 100.00 |
| 有所見者数 | 12 | 13 | 19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 66 | 2.07 |
| 有所見者率 (%) | 4.60 | 2.30 | 1.89 | 1.37 | 1.86 | 3.28 | 0.00 | 2.07 | |

(少数点第3位以下は四捨五入とする)