

**(4) 頸動脈超音波検査**

頸動脈超音波検査は心臓から脳につながる血管の動脈硬化の程度を調べる検査である。

人間ドックオプション検査、施設内セレクト健診、施設外健診にて実施している。

有所見者数はB2以上とする。

## &lt; 頸動脈超音波検査判定結果 &gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt; 男性 &gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	5	32	122	109	44	16	1	329	20.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	12	139	365	427	264	42	1,249	77.5
C	0	0	0	5	15	10	2	32	2.0
D	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	5	44	261	479	487	290	45	1,611	100.0
有所見者数(人)	0	12	139	370	443	274	44	1,282	79.6
有所見者率(%)	0.0	27.3	53.3	77.2	91.0	94.5	97.8	79.6	

## &lt; 女性 &gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	14	87	130	61	20	1	315	25.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	70	295	356	182	25	930	74.3
C	0	0	0	1	2	3	0	6	0.5
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2	16	157	426	419	205	26	1,251	100.0
有所見者数(人)	0	2	70	296	358	185	25	936	74.8
有所見者率(%)	0.0	12.5	44.6	69.5	85.4	90.2	96.2	74.8	

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	1	23	94	45	28	14	1	206	21.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	6	65	171	245	230	39	756	77.3
C	0	0	0	1	2	7	4	14	1.4
D	0	0	0	0	0	2	0	2	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	29	159	217	275	253	44	978	100.0
有所見者数(人)	0	6	65	172	247	239	43	772	78.9
有所見者率(%)	0.0	20.7	40.9	79.3	89.8	94.5	97.7	78.9	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	7	16	19	14	11	1	68	19.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	11	43	94	111	21	282	80.1
C	0	0	0	0	1	0	0	1	0.3
D	0	0	0	0	0	1	0	1	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	9	27	62	109	123	22	352	100.0
有所見者数(人)	0	2	11	43	95	112	21	284	80.7
有所見者率(%)	0.0	22.2	40.7	69.4	87.2	91.1	95.5	80.7	

## ③ 施設内健診

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	3	2	3	0	0	8	27.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	2	4	8	5	1	21	72.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1	5	6	11	5	1	29	100.0
有所見者数(人)	0	1	2	4	8	5	1	21	72.4
有所見者率(%)	0.0	100.0	40.0	66.7	72.7	100.0	100.0	72.4	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	2	2	4	0	0	8	27.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	6	7	8	0	21	72.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	0	2	8	11	8	0	29	100.0
有所見者数(人)	0	0	0	6	7	8	0	21	72.4
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	75.0	63.6	100.0	0.0	72.4	

## ④ 施設外健診

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1	46	28	8	6	0	89	30.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	37	60	65	35	0	197	67.5
C	0	0	1	0	1	1	0	3	1.0
D	0	0	0	0	2	1	0	3	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1	84	88	76	43	0	292	100.0
有所見者数(人)	0	0	38	60	68	37	0	203	69.5
有所見者率(%)	0.0	0.0	45.2	68.2	89.5	86.0	0.0	69.5	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	2	21	7	9	5	0	44	32.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	6	12	40	31	0	90	66.2
C	0	0	0	0	1	1	0	2	1.5
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	3	27	19	50	37	0	136	100.0
有所見者数(人)	0	1	6	12	41	32	0	92	67.6
有所見者率(%)	0.0	33.3	22.2	63.2	82.0	86.5	0.0	67.6	

## &lt;頸動脈超音波検査所見一覧&gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
正常範囲	5	32	122	109	44	16	1	329	16.2
内中膜複合体肥厚	0	2	37	118	160	120	24	461	22.7
プラーク	0	12	131	354	430	269	43	1,239	61.1
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	5	46	290	581	634	405	68	2,029	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
正常範囲	2	14	87	130	61	20	1	315	22.5
内中膜複合体肥厚	0	0	5	34	68	59	8	174	12.4
プラーク	0	2	69	287	349	181	25	913	65.1
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
小 計	2	16	161	452	478	260	34	1,403	100.0

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
正常範囲	1	23	94	45	28	14	1	206	16.2
内中膜複合体肥厚	0	1	16	65	110	107	26	325	25.5
プラーク	0	5	60	162	238	233	42	740	58.1
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	2	0	2	0.2
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	1	29	170	272	376	356	69	1,273	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
正常範囲	0	7	16	19	14	11	1	68	15.6
内中膜複合体肥厚	0	0	0	5	30	49	12	96	22.0
プラーク	0	2	11	42	90	106	21	272	62.2
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
小 計	0	9	27	66	134	167	34	437	100.0

## ③ 施設内健診

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
正常範囲	0	0	3	2	3	0	0	8	15.7
内中膜複合体肥厚	0	0	0	0	5	1	0	6	11.8
プラーク	0	1	3	5	13	11	4	37	72.5
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	0	1	6	7	21	12	4	51	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
正常範囲	0	0	2	2	4	0	0	8	18.2
内中膜複合体肥厚	0	0	0	2	2	0	0	4	9.1
プラーク	0	0	0	6	9	17	0	32	72.7
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	0	0	2	10	15	17	0	44	100.0

## ④ 施設外健診

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
正常範囲	0	1	46	28	8	6	0	89	17.0
内中膜複合体肥厚	0	0	9	20	34	17	0	80	15.3
プラーク	0	0	48	98	125	84	0	355	67.7
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	0	1	103	146	167	107	0	524	100.0

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
正常範囲	0	2	21	7	9	5	0	44	21.0
内中膜複合体肥厚	0	0	0	4	13	12	0	29	13.8
プラーク	0	2	7	13	61	54	0	137	65.2
潰瘍性プラーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
椎骨動脈逆流	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
小 計	0	4	28	24	83	71	0	210	100.0