

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

有所見者はB2以上とする。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	6	168	522	578	614	303	27	2,218	94.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	15	39	33	31	13	5	137	5.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	183	561	611	645	316	32	2,355	100.0
有所見者数	1	15	39	33	31	13	5	137	5.8
有所見者率(%)	14.3	8.2	7.0	5.4	4.8	4.1	15.6	5.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	3	76	250	293	247	110	11	990	94.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	5	18	23	8	9	0	63	6.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	81	268	316	255	119	11	1,053	100.0
有所見者数	0	5	18	23	8	9	0	63	6.0
有所見者率(%)	0.0	6.2	6.7	7.3	3.1	7.6	0.0	6.0	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	7	144	565	721	595	380	48	2,460	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	13	21	32	20	10	3	99	3.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	157	586	753	615	390	51	2,559	100.0
有所見者数	0	13	21	32	20	10	3	99	3.9
有所見者率（％）	0.0	8.3	3.6	4.2	3.3	2.6	5.9	3.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	2	39	162	236	215	151	16	821	96.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	6	8	12	4	1	31	3.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	39	168	244	227	155	17	852	100.0
有所見者数	0	0	6	8	12	4	1	31	3.6
有所見者率（％）	0.0	0.0	3.6	3.3	5.3	2.6	5.9	3.6	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	49	76	47	37	3	0	218	86.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	8	9	10	3	3	0	33	13.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	57	85	57	40	6	0	251	100.0
有所見者数	0	8	9	10	3	3	0	33	13.1
有所見者率（％）	0.0	14.0	10.6	17.5	7.5	50.0	0.0	13.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	56	94	67	30	7	0	260	90.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	7	7	5	10	0	0	29	10.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	63	101	72	40	7	0	289	100.0
有所見者数	0	7	7	5	10	0	0	29	10.0
有所見者率（％）	0.0	11.1	6.9	6.9	25.0	0.0	0.0	10.0	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	8	22	52	46	21	4	0	153	89.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	2	2	5	8	1	0	0	18	10.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	10	24	57	54	22	4	0	171	100.0
有所見者数	2	2	5	8	1	0	0	18	10.5
有所見者率（%）	20.0	8.3	8.8	14.8	4.5	0.0	0.0	10.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1	6	13	14	12	0	0	46	93.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	1	2	0	0	3	6.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1	6	13	15	14	0	0	49	100.0
有所見者数	0	0	0	1	2	0	0	3	6.1
有所見者率（%）	0.0	0.0	0.0	6.7	14.3	0.0	0.0	6.1	

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	14	40	21	19	3	0	97	83.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	6	4	4	2	3	0	19	16.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	20	44	25	21	6	0	116	100.0
有所見者数	0	6	4	4	2	3	0	19	16.4
有所見者率 (%)	0.0	30.0	9.1	16.0	9.5	50.0	0.0	16.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	16	58	34	19	2	0	129	89.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	3	3	2	7	0	0	15	10.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	19	61	36	26	2	0	144	100.0
有所見者数	0	3	3	2	7	0	0	15	10.4
有所見者率 (%)	0.0	15.8	4.9	5.6	26.9	0.0	0.0	10.4	