

6. 消化器

(1) 上部消化管 X 線検査

バリウム(造影剤)を飲んで胃粘膜にバリウムを付着させる為の体位変換を行い、角度をかえながら X 線撮影し、胃粘膜の凹凸変化を写しだす検査である。主にごん・潰瘍・ポリープ・粘膜の炎症などがわかる。

有所見者数は B1 以上とする。

① 1 日人間ドック

< 上部消化管 X 線検査判定結果 >

< 男性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	11	453	1,024	1,162	528	88	1	3,267	67.6
B1	2	41	138	188	122	22	0	513	10.6
B2	1	68	214	368	276	71	2	1,000	20.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	4	7	17	19	7	0	54	1.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	14	566	1,383	1,735	945	188	3	4,834	100.0
有所見者数 (人)	3	113	359	573	417	100	2	1,567	32.4
有所見者率 (%)	21.4	20.0	26.0	33.0	44.1	53.2	66.7	32.4	

< 女性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	14	287	625	644	255	42	2	1,869	58.0
B1	0	66	282	379	119	19	0	865	26.9
B2	0	18	111	181	122	36	0	468	14.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	3	8	5	2	0	18	0.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	14	371	1,021	1,212	501	99	2	3,220	100.0
有所見者数 (人)	0	84	396	568	246	57	0	1,351	42.0
有所見者率 (%)	0.0	22.6	38.8	46.9	49.1	57.6	0.0	42.0	

② 2日人間ドック

<上部消化管 X線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	2	8	5	2	0	17	58.6
B1	0	0	0	2	0	0	0	2	6.9
B2	0	2	2	2	4	0	0	10	34.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	2	4	12	9	2	0	29	100.0
有所見者数 (人)	0	2	2	4	4	0	0	12	41.4
有所見者率 (%)	0.0	100.0	50.0	33.3	44.4	0.0	0.0	41.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	1	0	0	0	0	2	33.3
B1	0	0	0	0	0	1	0	1	16.7
B2	0	0	0	2	1	0	0	3	50.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1	1	2	1	1	0	6	100.0
有所見者数 (人)	0	0	0	2	1	1	0	4	66.7
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	66.7	

③ 施設内健診

<上部消化管 X 線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	28	951	1,629	1,038	689	109	0	4,444	58.6
B1	0	141	307	254	158	27	0	887	11.7
B2	1	193	521	530	583	156	0	1,984	26.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	22	47	84	86	31	0	270	3.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	29	1,307	2,504	1,906	1,516	323	0	7,585	100.0
有所見者数 (人)	1	356	875	868	827	214	0	3,141	41.4
有所見者率 (%)	3.4	27.2	34.9	45.5	54.6	66.3	0.0	41.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	550	1,116	734	324	56	0	2,787	53.4
B1	1	175	529	488	192	19	0	1,404	26.9
B2	0	82	263	267	257	58	0	927	17.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	8	28	31	22	9	0	98	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	8	815	1,936	1,520	795	142	0	5,216	100.0
有所見者数 (人)	1	265	820	786	471	86	0	2,429	46.6
有所見者率 (%)	12.5	32.5	42.4	51.7	59.2	60.6	0.0	46.6	

<上部消化管 X 線検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	28	951	1,629	1,038	689	109	0	4,444
慢性胃炎	1	197	524	580	635	166	0	2,103
びらん性胃炎	0	4	3	6	6	0	0	19
胃ポリープ	0	138	310	276	164	28	0	916
胃隆起性病変	0	1	11	12	15	11	0	50
胃潰瘍	0	0	1	2	1	0	0	4
胃潰瘍癒痕	0	2	5	15	14	5	0	41
胃粘膜下腫瘍	0	4	18	15	19	6	0	62
ひだの異常	0	4	6	4	7	3	0	24
胃陥凹性病変	0	3	6	23	19	4	0	55
粘膜不整（胃）	0	6	22	25	28	11	0	92
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	3	8	21	25	8	0	65
食道隆起性病変	0	1	4	8	7	1	0	21
食道陥凹性病変	0	1	0	1	3	0	0	5

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	7	550	1,116	734	324	56	0	2,787
慢性胃炎	0	85	248	272	252	62	0	919
びらん性胃炎	0	0	5	3	3	0	0	11
胃ポリープ	1	177	545	503	203	20	0	1,449
胃隆起性病変	0	0	9	8	8	2	0	27
胃潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍癒痕	0	0	4	3	1	0	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	3	27	6	18	2	0	56
ひだの異常	0	3	2	3	0	0	0	8
胃陥凹性病変	0	1	5	5	10	2	0	23
粘膜不整（胃）	0	2	11	9	5	3	0	30
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	7	10	6	2	0	25
食道隆起性病変	0	0	2	5	2	0	0	9
食道陥凹性病変	0	0	0	0	0	1	0	1

④ 施設外健診

<上部消化管 X 線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	364	1,088	655	603	492	0	3,209	57.7
B1	0	23	142	111	87	77	1	441	7.9
B2	0	56	315	282	464	631	0	1,748	31.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	3	24	29	44	59	0	160	2.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	8	446	1,569	1,077	1,198	1,259	1	5,558	100.0
有所見者数 (人)	1	82	481	422	595	767	1	2,349	42.3
有所見者率 (%)	12.5	18.4	30.7	39.2	49.7	60.9	100.0	42.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	163	337	278	291	201	0	1,273	48.9
B1	0	39	149	110	156	78	0	532	20.5
B2	0	19	92	106	243	278	1	739	28.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	7	5	20	23	1	57	2.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	222	585	499	710	580	2	2,601	100.0
有所見者数 (人)	0	59	248	221	419	379	2	1,328	51.1
有所見者率 (%)	0.0	26.6	42.4	44.3	59.0	65.3	100.0	51.1	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<上部消化管 X 線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	812	1,474	920	583	57	0	3,846	58.3
B1	0	111	272	226	131	19	0	759	11.5
B2	0	170	485	487	489	107	0	1,738	26.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	20	48	82	79	21	0	250	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,113	2,279	1,715	1,282	204	0	6,593	100.0
有所見者数 (人)	0	301	805	795	699	147	0	2,747	41.7
有所見者率 (%)	0.0	27.0	35.3	46.4	54.5	72.1	0.0	41.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	383	777	514	216	19	0	1,909	53.6
B1	0	130	353	351	124	6	0	964	27.1
B2	0	58	187	191	167	18	0	621	17.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	7	23	22	15	2	0	69	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	578	1,340	1,078	522	45	0	3,563	100.0
有所見者数 (人)	0	195	563	564	306	26	0	1,654	46.4
有所見者率 (%)	0.0	33.7	42.0	52.3	58.6	57.8	0.0	46.4	

