

(4)全大腸内視鏡検査

全大腸内視鏡検査では、検査前に腸管洗浄剤を服用し、肛門から盲腸まで大腸全体の粘膜の観察を行う。

有所見者数はB2以上とする。

<検査結果判定>

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	1	11	18	13	3	47	28.3
B1	0	0	7	17	16	7	47	28.3
B2	0	0	4	14	24	13	55	33.1
D	0	0	0	4	7	6	17	10.2
受診者数(人)	1	1	22	53	60	29	166	100.0
有所見者数(人)	0	0	4	18	31	19	72	43.4
有所見率(%)	0.0	0.0	18.2	34.0	51.7	65.5	43.4	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	14	14	7	7	43	62.3
B1	1	2	3	4	3	13	18.8
B2	0	0	4	4	1	9	13.0
D	0	1	1	0	2	4	5.8
受診者数(人)	2	17	22	15	13	69	100.0
有所見者数(人)	0	1	5	4	3	13	18.8
有所見率(%)	0.0	5.9	22.7	26.7	23.1	18.8	

⑥ 外来診療

<男性>

	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	0	0	0	0.0
B1	1	0	1	50.0
B2	0	1	1	50.0
D	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	1	2	100.0
有所見者数(人)	0	1	1	50.0
有所見率(%)	0.0	100.0	50.0	

<女性>

	30～39	合計(人)	比率(%)
A	1	1	100.0
B1	0	0	0.0
B2	0	0	0.0
D	0	0	0.0
受診者数(人)	1	1	100.0
有所見者数(人)	0	0	0.0
有所見率(%)	0.0	0.0	

<検査所見>

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	1	11	18	13	3	47
痔核	0	0	1	1	2	2	6
大腸憩室	0	0	6	25	39	14	84
大腸炎	0	0	1	1	2	0	4
潰瘍性病変	0	0	0	0	1	0	1
大腸ポリープ	0	0	6	29	40	44	119
粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	1
その他の病変	0	0	1	3	3	1	8
総計	1	1	26	77	101	64	270

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	14	14	7	7	43
痔核	1	0	0	2	0	3
大腸憩室	1	1	2	7	3	14
大腸炎	0	1	0	1	0	2
大腸ポリープ	0	2	4	4	7	17
隆起性病変	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	0	3	0	0	3
総計	3	18	24	21	17	83

⑥ 外来診療

<男性>

	60～69	70～79	合計(人)
大腸憩室	1	0	1
大腸ポリープ	0	1	1
総計	1	1	2

<女性>

	30～39	合計(人)
異常なし	1	1
総計	1	1

<大腸組織検査結果>

組織検査なし