

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

有所見者はB2以上とする。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	4	149	491	607	681	427	40	2,399	95.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	6	24	32	31	17	2	112	4.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	155	515	639	712	444	42	2,511	100.0
有所見者数	0	6	24	32	31	17	2	112	4.5
有所見者率(%)	0.0	3.9	4.7	5.0	4.4	3.8	4.8	4.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	7	88	282	316	314	199	15	1,221	95.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	6	18	10	13	14	0	61	4.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	94	300	326	327	213	15	1,282	100.0
有所見者数	0	6	18	10	13	14	0	61	4.8
有所見者率(%)	0.0	6.4	6.0	3.1	4.0	6.6	0.0	4.8	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	6	129	499	714	655	375	55	2,433	97.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	5	16	12	17	7	3	60	2.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	134	515	726	672	382	58	2,493	100.0
有所見者数	0	5	16	12	17	7	3	60	2.4
有所見者率（%）	0.0	3.7	3.1	1.7	2.5	1.8	5.2	2.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2	43	146	255	244	153	20	863	96.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	2	7	9	6	4	28	3.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	43	148	262	253	159	24	891	100.0
有所見者数	0	0	2	7	9	6	4	28	3.1
有所見者率（%）	0.0	0.0	1.4	2.7	3.6	3.8	16.7	3.1	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	9	62	71	58	44	6	0	250	87.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	6	11	9	9	1	0	37	12.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	10	68	82	67	53	7	0	287	100.0
有所見者数	1	6	11	9	9	1	0	37	12.9
有所見者率（%）	10.0	8.8	13.4	13.4	17.0	14.3	0.0	12.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	5	41	97	60	26	5	0	234	91.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	2	3	7	5	4	1	0	22	8.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	44	104	65	30	6	0	256	100.0
有所見者数	2	3	7	5	4	1	0	22	8.6
有所見者率（%）	28.6	6.8	6.7	7.7	13.3	16.7	0.0	8.6	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	32	49	45	17	6	0	155	93.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	3	3	2	2	0	0	11	6.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	35	52	47	19	6	0	166	100.0
有所見者数	1	3	3	2	2	0	0	11	6.6
有所見者率 (%)	14.3	8.6	5.8	4.3	10.5	0.0	0.0	6.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	1	11	8	11	0	0	34	97.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	1	11	9	11	0	0	35	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	0	0	1	2.9
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	2.9	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	18	35	24	23	5	0	105	82.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	3	5	4	9	1	0	22	17.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	21	40	28	32	6	0	127	100.0
有所見者数	0	3	5	4	9	1	0	22	17.3
有所見者率 (%)	0.0	14.3	12.5	14.3	28.1	16.7	0.0	17.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	10	46	28	13	4	0	101	91.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	0	4	2	1	0	9	8.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	12	46	32	15	5	0	110	100.0
有所見者数	0	2	0	4	2	1	0	9	8.2
有所見者率 (%)	0.0	16.7	0.0	12.5	13.3	20.0	0.0	8.2	